Инструкция по применению
Флоцета бэби гель 15 г



Характеристики

Форма выпуска: Гель
Страна: Хорватия
Производитель: Белупо
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1
Срок годности: 24.0

Состав

В экстракте Ромашки аптечной содержится комплекс биологически активных компонентов (хамазулен, бисаболол, терпеновые соединения, дубильные вещества и витамины). Хорошо известно, что экстракт ромашки эффективен для решения многих дерматологических проблем у детей. Свойства экстракта ромашки: регенерирующее, заживляющее, противовоспалительное, тонизирующее и противомикробное, улучшает дыхание кожи и обмен веществ в ней. • Экстракт цветков Календулы лекарственной содержит эфирное масло, каротиноиды, флаваноиды, фитонциды, органические кислоты, витамин С. Это одно из излюбленных (наряду с экстрактом ромашки) противовоспалительных и антисептических средств, используемых для чувствительной кожи. Экстракт календулы обладает антисептическим, противовоспалительным и восстанавливающим действием на коже. • Экстракт листьев и коры гамамелиса (виргинского ореха) содержит гликозид гамамелитарин, вяжущие таннины, антиоксидант кверцетин, фитостерин, эфирное масло и др. биологически активные компоненты. Экстракт гамамелиса оказывает на коже антибактериальное и противоотечное действие. Танины, содержащиеся в экстракте обладают выраженным антибактериальным и антиэкссудативным действием. Гамамелис способствует оттоку жидкости из сосудов и укреплению сосудистой стенки. Издревле настой из листьев гамамелиса использовался северо-американскими индейцами в качестве ранозаживляющего средства.

Форма выпуска

Гель

Фармакокинетика

отсутствует

Показания

• Снижение риска развития пеленочного дерматита (пеленочной сыпи) у детей раннего возраста, • Снижение риска развития потницы у грудных детей, • Контактный дерматит, возникающий вследствие раздражения кожи мочой, • Симптомы при легких ожогах (в т.ч. солнечных), а также поражений кожи вследствие других неблагоприятных внешних воздействий, • Повреждения кожных покровов различной этиологии

Способ применения и дозы

Наружно. • Использовать при первых признаках раздражения и воспаления на коже ребенка. • Наносить на чистую кожу три и более раз в день. Для профилактики пеленочного дерматита и раздражения: • Гель наносят на кожу ягодиц и промежности тонким слоем при каждой смене пеленок или подгузников, обязательно обрабатывая и кожные складки. • Для профилактики перед сном наносят на кожу ребенка, которую закрывает подгузник.

Противопоказания

Флоцета® Бэби гель не следует использовать при повышенной чувствительности к компонентам препарата

Применение при беременности и кормлении грудью

Не противопоказано при условие отсутствия индивидуальной непереносимости компонентов препарата

Побочные действия

Побочные эффекты средства не описаны.

Передозировка

Не известны случаи передозировки препаратом Флоцета.

Особые указания

Рекомендуется прекратить применение при первых признаках аллергической кожной реакции. Гель предназначен только для наружного применения. Избегайте попадания в глаза.

Условия хранения

Беречь от детей