**Инструкция по применению**
**Флогэнзим Таблетки 100 шт**

## Характеристики




Форма выпуска: Таблетки
Страна: Германия
Производитель: Мукос Эмульсионс ГмбХ
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Бромелаин+Трипсин+Рутин
Количество в упаковке: 100
Дозировка действующего вещества: 90 мг+ 48 мг+ 100 мг
Срок годности: 36.0

## Описание

Флогэнзим – лекарственный препарат, состоящий из высокоактивных протеолитических энзимов растительного и животного происхождения в сочетании с рутозидом. Препарат Флогэнзим применяют для комплексного лечения и профилактики осложнений после операций и травм, а также при остром воспалении. Препарат Флогэнзим применяют в: хирургии, урологии и гинекологии (в том числе для восстановления после операций и профилактики спаек), травматологии (в том числе после перелома, после эндопротезирования и остеосинтеза), стоматологии (в том числе для предупреждения осложнений в послеоперационный период после удаления зуба, для улучшения интеграции имплантов, при остеосинтезе, при лечении гнойно-воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области), и других областях медицины. Флогэнзим оказывает множественное действие: противоотечное, противовоспалительное, вторично анальгезирующее, иммуномодулирующее, фибринолитическое, тромболитическое, антиагрегантное, повышение эффективности антибиотиков. Энзимы препарата положительно влияют на улучшение микроциркуляции, повышение доставки кислорода и питательных веществ в рану, уменьшение воспаления в очаге повреждения, поддержание физиологического процесса регенерации и ускорение восстановления функции органов и тканей.

## Действующее вещество

Бромелаин+Трипсин+Рутин

**Состав**

бромелаин 450 FIP Ед. (90,0 мг), трипсин 1440 FIP Ед. (48,0 мг), рутозида тригидрат 100,0 мг.

**Форма выпуска**

Таблетки

**Показания**

Хирургия: послеоперационное восстановление и реабилитация больных (улучшение репаративных процессов и регенерации), послеоперационные гнойно-воспалительные осложнения, предупреждение развития спаечной болезни и образования келоидного рубца, снижение риска тромбоэмболических осложнений при длительной иммобилизации. Травматология: переломы костей, повреждения сухожилий и связок, ушибы и гематомы мягких тканей, спортивные травмы, ожоги, улучшение интеграции эндопротезов, остеосинтез. Ангиология: тромбофлебиты поверхностных вен, посттромботическая болезнь, облитерирующий атеросклероз артерий нижних конечностей и другие хронические ангиопатии, нарушения микроциркуляции, лимфатические отеки (лимфедема). Урология: острые и хронические воспаления мочеполового тракта (цистит, уретрит, простатит). Гинекология: сосудистые осложнения климактерического периода, снижение частоты и выраженности осложнений заместительной гормональной терапии. Кардиология: ишемическая болезнь сердца, снижение риска сосудистых катастроф и повторных инфарктов. Гастроэнтерология: гепатиты. Ревматология: ревматоидный артрит, анкилозирующий спондилоартрит, реактивный артрит, ревматическое поражение мягких тканей. Неврология: ишемический инсульт, рассеянный склероз. Пульмонология: хроническая обструктивная болезнь легких. Стоматология: предупреждение осложнений в послеоперационный период при экстракции зубов, гнойно-воспалительные заболевания челюстно-лицевой области, реабилитация и восстановление после хирургических вмешательств на челюстно-лицевой области, улучшение интеграции имплантов, остеосинтез.

**Способ применения и дозы**

Флоэнзим принимают внутрь, не менее чем за 30 мин. до еды, не раскусывая, запивая водой (200 мл). После операции препарат рекомендуется принимать со 2-3 дня. Препарат принимают после травм и операций или остром воспалении для расщепления и удаления поврежденных тканей, рассасывания гематом, улучшения трофики тканей и репаративных процессов, уменьшения воспаления и отека, снижения риска осложнений – тромбоза, развития спаечной болезни, образования келоидного рубца и нагноения раны, по 3 таблетки 3 раза в день в течение 2 недель. В случае необходимости, для улучшения восстановления и заживления курс приема препарата может быть продлен до 4 недель и более по 2 таблетки 3 раза в день.

**Противопоказания**

При индивидуальной непереносимости компонентов препарата. Врожденных или приобретенных нарушениях свертываемости крови. Детском возрасте.AD4

**Применение при беременности и кормлении грудью**

Беременность и грудное вскармливание не являются противопоказанием для применения препарата, однако, беременные женщины должны принимать ВОБЭНЗИМ под контролем врача.

**Побочные действия**

Препарат хорошо переносится пациентами. В отдельных случаях может наблюдаться учащение стула, изменение консистенции и запаха стула, которые быстро купируются при временном снижении дозировки препарата. Изредка может возникать аллергическая реакция (кожная сыпь, зуд), которая исчезает после снижения дозы или отмены препарата. При нарушении условий применения препарата возможно возникновение тошноты, вздутия и болей в животе, головной боли, головокружения, экзантемы, общей слабости, ощущения переполненности кишечника. Данные состояния исчезают после снижения дозировки или временной отмены препарата. Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции, или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

**Передозировка**

Случаев передозировки препарата неизвестно.

**Взаимодействие с другими препаратами**

Случаев несовместимости с другими лекарственными средствами не отмечалось. Применение препарата совместно с антибиотиками повышает эффективность антибиотикотерапии. При применении с гормонами препарат снижает риск тромбообразования. Применение с антибиотиками При назначении антибиотиков препарат применяется для повышения эффективности антибиотикотерапии и уменьшения нежелательных эффектов антибиотиков. Препарат рекомендуется принимать в течение всего курса антибиотикотерапии по 2 таблетки 3 раза в день. Применение с гормонами При назначении длительных курсов гормонов препарат рекомендуется принимать для снижения риска развития осложнений (тромбозов) по 2 таблетки 3 раза в день в течение всего курса приема гормональных препаратов. При назначении заместительной гормональной терапии (ЗГТ) для снижения риска тромбоза вен нижних конечностей, препарат рекомендуется принимать по 2 таблетки 3 раза в день повторными курсами по 2 недели с перерывами по 3 недели 3-4 раза в год.

**Особые указания**

В случае инфекционных процессов ФЛОГЭНЗИМ не заменяет антибиотики. В случае обострения основного заболевания при приеме препарата рекомендуется временное снижение дозы препарата или временная отмена препарата после консультации с врачом. Препарат не является допингом, не оказывает негативного влияния на вождение автомобиля и выполнение работ, требующих высокой скорости психических и физических реакций. Пациентам, страдающим сахарным диабетом, следует учитывать, что каждая таблетка препарата содержит 0,015 хлебных единиц.

**Срок хранения после открытия**

3 года.

**Условия хранения**

В сухом месте