Инструкция по применению
Флорин Форте Капсулы 30 шт

Характеристики



Форма выпуска: Капсулы
Страна: Россия
Производитель: ПроБиоФарм
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Бифидобактерии+Лактобактерии
Количество в упаковке: 30
Срок годности: 18.0

Действующее вещество

Бифидобактерии+Лактобактерии

Состав

Одна капсула содержит: активные компоненты: бифидобактерии B.bifidum, сорбированные на активированном угле – не менее 50 млн колониеобразующих единиц (5х107 КОЕ), лактобактерии L.plantarum – не менее 50 млн колониеобразующих единиц (5х107 КОЕ), вспомогательные вещества: компоненты среды высушивания (сахарозо-желатиновой) – сахароза 8,08–8,24 мг, желатин 1,07–1,09 мг, уголь активированный 2,73–2,79 мг, магния стеарат 1–10 мг, лактозы моногидрат до 0,20 г. Состав оболочки капсулы: корпус капсулы – диоксид титана (белый цвет) 1,0-2,0%, желатин до 100%, крышка капсулы – диоксид титана 1,0-2,0%, оксид железа (желтый цвет) 0,05–1,8%, желатин до 100%.

Форма выпуска

Капсулы

Показания

Заболевания, сопровождающиеся нарушением нормальной микрофлоры кишечника с дефицитом бифидобактерий, лактобактерий или нормальных кишечных палочек. Острые кишечные инфекции, обусловленные ротавирусами и/или условно патогенной микрофлорой.Острые кишечные инфекции неустановленной этиологии.Острые респираторные заболевания как вирусного, так и микробного происхождения. Хронические заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), в том числе с выявленными гемолитическими кишечными палочками и ассоциациями условно патогенных микроорганизмов в высоких титрах.Восстановление нормофлоры кишечника в период реконвалесценции после перенесенных заболеваний. Дисбактериозы различной этиологии.

Способ применения и дозы

Препарат предназначается к применению у взрослых и детей с первых дней жизни (в том числе недоношенных). Возрастные дозировки: - взрослым по 2 капсулы 3 раза в сутки, - детям в возрасте до 6 месяцев по 1 капсуле 2 раза в сутки, - детям с 6 месяцев до 3 лет по 1 капсуле 3 раза в сутки, - детям с 3-х лет и старше по 1 капсуле 3 – 4 раза в сутки. Курс лечения: - при заболеваниях, сопровождающихся нарушением нормальной микрофлоры кишечника 10 – 15 дней, - при острых кишечных инфекциях 5 – 7 дней, - при острых респираторных заболеваниях 5 – 10 дней, - при хронических заболеваниях ЖКТ 10 – 15 дней, - в период реконвалесценции после перенесенных заболеваний 10 – 15 дней, - при дисбактериозах 10 – 15 дней. Флорин форте принимают внутрь во время приема пищи, при необходимости независимо от приема пищи, запивая водой. Детям и пациентам, которые не могут проглотить целую капсулу, ее вскрывают. Содержимое капсулы смешивают с жидкой пищей, желательно кисломолочным продуктом. Можно смешать содержимое капсулы с 5-30 мл кипяченой воды комнатной температуры в ложке или стакане, при этом образуется мутная взвесь с частичками сорбента черного цвета. Полученную водную взвесь следует выпить, не добиваясь полного растворения.

Противопоказания

Врожденная недостаточность лактазы. Нарушение всасывания глюкозы-галактозы. Индивидуальная непереносимость препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью

Препарат разрешен для применения при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

Побочные действия

Не установлены.

Взаимодействие с другими препаратами

При одновременном приеме с витаминами (особенно группы В) действие препарата усиливается. При приеме с антибиотиками возможно снижение терапевтической эффективности препарата.

Особые указания

С осторожностью следует применять препарат при лактазной недостаточности.