Инструкция по применению
Флористин Плюс Флакон 250 мл

Характеристики



Форма выпуска: Жидкость
Страна: Россия
Производитель: Вектор-Биальгам
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1

Описание

Представляет собой жидкую культуру активных молочнокислых ацидофильных палочек фармакопейного штамма ЕР 317/402 «Наринэ» в количестве не менее 1 млрд. в 1мл и ее производные: витамины, микроэлементы, аминокислоты, в том числе незаменимые, органические кислоты, антимикробные вещества натурального происхождения.

Форма выпуска

Жидкость

Показания

 -в комплексном лечении инфекционных заболеваний кишечника и дисбактериоза; -при дисфункции кишечника: поносе, запоре, интенсивном газообразовании; - для восстановления микрофлоры при антибиотико-, гормональной, лучевой и химиотерапии (одновременно с антибиотиками и другим лечением); - для поддержания иммунитета за счет стимуляции синтеза цитокинов и интерферона; - для эффективного очищения организма от шлаков и токсинов; - во время беременности и послеродовом периоде, при вскармливании грудью; - при коррекции микробиоценоза открытых слизистых: ротовой полости, носоглотки, гениталий; - для повышения усвоения железа, кальция, витаминов при железодефицитной анемии, гиповитаминозе, остеопорозе, рахите; -при иммунных нарушениях с кожными проявлениями (экссудативный диатез, экзема, дерматиты, дерматозы); - беременным - при токсикозе, и при дисфункции кишечника

Противопоказания

Препарат не имеет противопоказаний за исключением индивидуальной непереносимости отдельных компонентов. Физиологичен для человека, поскольку в его состав входят только те компоненты, которые должны присутствовать в организме здорового взрослого и ребенка.

Применение при беременности и кормлении грудью

Кратность, дозы и длительность приема могут меняться на усмотрение врача. Принимать внутрь во время или до еды 1-3 раза в день. Возможен однократный прием суточной дозы. Перед употреблением флакон взбалтывать, т.к. возможно отслоение сыворотки. Отлитую дозу можно развести любой пищевой жидкостью t не выше 370С, употребить сразу. При повышенной кислотности можно разводить слабощелочной минеральной водой без газа. При антибактериальной терапии назначают с первого дня лечения, с интервалом 2-4 часа от приема антибиотика. Для защиты нормальной микрофлоры кишечника во время приема антибиотиков курс приема составляет весь период приема антибиотиков. Рекомендуемые дозировки: Принимать перед едой в 1-3 приема детям от 1,5 до 3 лет 4-6 мл в сутки; детям от 3 до 12 лет 10-15 мл в сутки; детям старше 12 лет и взрослым – 20-30 мл в сутки в течение трех недель. Повторение курса 2-3 раза в год. Местное применение -Ректально: в толстый кишечник вводить 3-5 мл препарата, разведенного в 50 мл теплой воды микроклизмой. Рекомендуемый курс 10-14 дней - Гинекологические заболевания дрожжевой, бактериальной и вирусной природы (воспалительные процессы, бактериальный вагиноз, молочница) Инстилляции шприцем или 5-10 мл препарата развести 1:2 водой не выше 37о С, пропитать ватно-марлевый тампон и ввести интравагинально на 4-8 часов. Курс 10-14 дней. Одновременно принимать препарат перорально. - Гнойные и воспалительные поражения кожи без нарушения целостности кожных покровов (пиодермия, угри, дерматиты)-в виде масок и аппликаций. Марлевую салфетку пропитать 10-20 мл препарата, разведенного 1:2 кипяченой водой (t не выше 37оС), в виде аппликации наложить на кожу и выдержать до высыхания, но не менее 15 минут, 1-2 раза в день. Курс 10-14 дней. - Заболевания десен (пародонтоз, стоматиты, гингивиты), Ангина. Полоскание разбавленным в 2 раза препаратом сразу после еды и перед сном. - Закапывание в нос: 1 мл препарата развести 1:2 кипяченой водой (t не выше 37оС), капать по 2-3 капли 2-4 раза в день. Курс 3-7 дней.

Условия хранения

В холодильнике при t +2 +6 С.