Инструкция по применению
Флуцинар Гель 0,025 % 15 г

Характеристики



Форма выпуска: Гель
Страна: Польша
Производитель: Валеант
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Флуоцинолона ацетонид
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 0,025%
Срок годности: 24

Действующее вещество

Флуоцинолона ацетонид

Состав

Флуоцинолона ацетонид 250 мкг.Вспомогательные вещества: пропиленгликоль - 150 мг, этанол - 150 мг, динатрия эдетат - 0.25 мг, лимонная кислота - 0.1 мг, метилпарагидроксибензоат - 1.5 мг, пропилпарагидроксибензоат - 0.8 мг, карбомер 980 - 9 мг, троламин - 1.8 мг, вода очищенная - до 1 г.

Форма выпуска

Гель

Показания

Псориаз, красный плоский лишай, себорейный дерматит, экзема различного генеза и локализации (включая экзему у детей), нейродермит, кожный зуд различного генеза, аллергические заболевания кожи, дискоидная красная волчанка, ожоги I степени, солнечные ожоги, укусы насекомых.

Способ применения и дозы

Применяют наружно 1-3 раза/сут, в зависимости от используемой лекарственной формы.

Противопоказания

Бактериальные, вирусные, грибковые кожные заболевания, туберкулез кожи, кожные проявления сифилиса, обширные псориатические бляшки, аногенитальный зуд, трофические язвы голени, связанные с варикозным расширением вен, опухоли кожи, беременность.

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказан при беременности.

Побочные действия

Возможно: телеангиэктазии, постстероидная сосудистая пурпура, атрофия кожи, растяжение кожи, гирсутизм, гипертрихоз, периоральный дерматит, вторичные инфекционные поражения кожи; при длительном применении и/или при нанесении на большие поверхности возможны системные побочные эффекты.

Особые указания

В случае применения при обыкновенных или розовых угрях возможно обострение течения заболевания.С осторожностью применяют у детей грудного возраста и у девушек в период полового созревания.Флуоцинолона ацетонид совместим с противомикробными средствами.

Условия хранения

Беречь от детей