Инструкция по применению
Флуифорт Гранулы для суспензии 2,7 г/5 г пакетики 5 г 10 шт

Характеристики



Форма выпуска: Суспензия
Страна: Италия
Производитель: Dompe Farmaceutici
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Карбоцистеин
Количество в упаковке: 10
Дозировка действующего вещества: 2,7 г/5 г

Действующее вещество

Карбоцистеин

Состав

Карбоцистеина лизиновой соли моногидрат 2.7 г. Вспомогательные вещества: лимонная кислота - 0.08 г, маннитол - 0.9185 г, повидон - 0.1 г, ароматизатор кедрозый натуральный - 0.04 г, ароматизатор апельсиновый натуральный - 0.04 г, сок апельсина (порошковый) - 0.296 г, аспартам - 0.03 г, мальтодекстрин - 0.7955 г.

Форма выпуска

Суспензия

Фармакокинетика

Всасывание: Быстро и полностью абсорбируется после приема внутрь. Cmax в крови и секрете достигается в течение первого часа после приема. Распределение: Терапевтическая концентрация сохраняется в крови в течение 8 ч. Выведение: T1/2 составляет 1.8 ч. Выводится преимущественно с мочой, примерно 30-60% - в неизмененном виде, остальное - в виде метаболитов.

Показания

Острые и хронические бронхолегочные заболевания, сопровождающиеся образованием вязкой и трудноотделяемой мокроты, в т.ч.:— трахеит— бронхит— трахеобронхит— бронхиальная астма— бронхоэктатическая болезньВоспалительные заболевания среднего уха и придаточных пазух носа, сопровождающиеся образованием вязкой и трудноотделяемой слизи, в т.ч.:— ринит— аденоидит— средний отит— синусит.Подготовка пациента к бронхоскопии и бронхографии.

Способ применения и дозы

Препарат принимают внутрь. Взрослым назначают по 1 пак./сут. Содержимое пакетика перед приемом следует растворить в воде и перемешать. Длительность лечения устанавливает врач (от 4 дней до 6 мес). При нарушениях функции печени и почек, а также при сахарном диабете коррекции дозы не требуется.

Противопоказания

— язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в фазе обострения— детский и подростковый возраст до 16 лет— I триместр беременности— период лактации— фенилкетонурия— повышенная чувствительность к компонентам препарата.С осторожностью следует применять препарат при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки в анамнезе, во II и III триместрах беременности.