Инструкция по применению
Флуифорт Сироп 90 мг/мл 100 мл

Характеристики



Форма выпуска: Сироп
Страна: Италия
Производитель: Dompe Farmaceutici
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Карбоцистеин
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 90 мг/мл
Срок годности: 24

Действующее вещество

Карбоцистеин

Состав

Карбоцистеина лизиновой соли моногидрат 9 г. Вспомогательные вещества: сахароза - 40 г, натуральная эссенция вишни - 0.25 г, метил-п-гидроксибензоат - 0.15 г, карамель - 0.03 г, вода очищенная - до 100 мл.

Форма выпуска

Сироп

Фармакокинетика

Всасывание: Быстро и полностью абсорбируется после приема внутрь. Cmax в крови и секрете достигается в течение первого часа после приема. Распределение: Терапевтическая концентрация сохраняется в крови в течение 8 ч. Выведение: T1/2 составляет 1.8 ч (при дозе 2 г/сут). Выводится преимущественно с мочой, примерно 30-60% - в неизмененном виде, остальное - в виде метаболитов.

Показания

Острые и хронические бронхолегочные заболевания, сопровождающиеся образованием вязкой и трудноотделяемой мокроты, в т.ч.:— трахеит— бронхит— трахеобронхит— бронхиальная астма— бронхоэктатическая болезньВоспалительные заболевания среднего уха и придаточных пазух носа, сопровождающиеся образованием вязкой и трудноотделяемой слизи, в т.ч.:— ринит— аденоидит— средний отит— синусит.Подготовка пациента к бронхоскопии и бронхографии.

Способ применения и дозы

Препарат принимают внутрь. Детям в возрасте от 1 года до 5 лет - по 2.5 мл (225 мг) сиропа 2-3 раза/сут; детям старше 5 лет - по 5 мл (450 мг) сиропа 2-3 раза/сут. Взрослым по 15 мл (1.35 г) сиропа 2-3 раза/сут. Длительность лечения устанавливает врач (от 4 дней до 6 мес). При нарушениях функции печени и почек, а также при сахарном диабете коррекции дозы не требуется. Для вскрытия флакона следует сильно нажать на колпачок и повернуть против часовой стрелки. После применения снова плотно завернуть колпачок.

Противопоказания

— язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в фазе обострения— детский возраст до 1 года— I триместр беременности— период лактации— повышенная чувствительность к компонентам препарата.С осторожностью следует применять препарат при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки в анамнезе, во II и III триместрах беременности.

Условия хранения

В сухом месте