Инструкция по применению
Флуифорт Сироп 90 мг/мл 120 мл

Характеристики

Форма выпуска: Сироп
Страна: Италия
Производитель: Dompe Farmaceutici
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Карбоцистеин
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 90 мг/мл

Описание

Сироп Флуифорт - муколитическое и отхаркивающее действие обусловлено активацией сиаловой трансферазы - фермента бокаловидных клеток слизистой оболочки бронхов.

Действующее вещество

Карбоцистеин

Состав

Моногидрат карбоцистеина, сахароза, натуральная эссенция вишни, метил-п-гидроксибензоат, карамель, очищенная вода.

Форма выпуска

Сироп

Фармакокинетика

Быстро и полностью абсорбируется после перорального приема. Максимальная концентрация в крови и секрете достигается в течение первого часа после приема препарата. Терапевтическая концентрация сохраняется в крови в течение 8 часов. Период полувыведения - 1,8 часа. Выводится преимущественно с мочой, примерно 30-60% - в неизменном виде, остальное - в виде метаболитов.

Показания

Острые и хронические бронхолегочные заболевания, сопровождающиеся образованием вязкой и трудноотделяемой мокроты (трахеит, бронхит, трахеобронхит, бронхиальная астма, бронхоэктатическая болезнь) и слизи (воспалительные заболевания среднего уха и придаточных пазух носа - ринит, аденоидит, средний отит, синусит), подготовка больного к бронхоскопии или бронхографии.

Способ применения и дозы

Внутрь. К упаковке прилагается мерный стаканчик с делениями, согласно рекомендуемым дозам. Детям старше 5 лет: 5 мл сиропа (450 мг) - 2-3 раза в день. Детям от 1 года до 5 лет: 2,5 мл сиропа (225 мг) - 2-3 раза в день. Взрослым: 15 мл сиропа (1,35 г) - 2-3 раза в день. Длительность лечения определяется врачом (от 4 дней до 6 месяцев). Указанная дозировка сохраняется для пациентов с нарушенными функциями печени и почек, а также для пациентов, страдающих диабетом. Для вскрытия флакона сильно нажать сверху на колпачок и повернуть против часовой стрелки. После применения снова плотно завернуть колпачок.

Противопоказания

-Гиперчувствительность к карбоцистеину или другим компонентам препарата; -Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения; -Хронический гломерулонефрит (в стадии обострения), цистит; -Беременность; -Детский возраст до 2 лет; -Дефицит сахаразы/изомальтазы, -Непереносимость фруктозы; -Глюкозо-галактозная мальабсорбция (т.к. препарат содержит сахарозу)..

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение в период беременности и грудного вскармливания Беременность Применение Флуифорта у беременных женщин не рекомендуется (см. раздел «Противопоказания»), Период грудного вскармливания Неизвестно, выделяется ли карбоцистеин с грудным молоком. В период грудного вскармливания Флуифорт следует применять с осторожностью (см. раздел «С осторожностью»).

Побочные действия

Для карбоцистеина характерны следующие побочные эффекты: редко - гастрит, тошнота, диарея, головокружение, недомогание, кожная сыпь. Лизиновая соль карбоцистеина: редко - боль в эпигастрии, тошнота, диарея, кожная сыпь. Все перечисленные нарушения носят транзиторный характер и исчезают после прекращения приема препарата или после сокращения дозировки. При проявлении какого-либо побочного эффекта следует обратиться к лечащему врачу.

Передозировка

В настоящее время о случаях передозировки препаратом Флуифорт не сообщалось. Возможные симптомы передозировки: боли в желудке, тошнота, диарея. Лечение: симптоматическое. Специфичного антитода не существует.

Взаимодействие с другими препаратами

В настоящее время неизвестны случаи взаимодействия карбоцистеина и лекарственных средств, обычно применяемых при лечении заболеваний дыхательных путей. Не выявлено взаимодействия лекарственного средства и продуктов питания, а также веществ, применяемых для лабораторных исследований. Эффект ослабляется противокашлевыми и М-холиноблокирующими лекарственными средствами. Повышает эффективность глюкокортикостероидов (взаимно) и антибактериальной терапии инфекционно-воспалительных заболеваний верхних и нижних дыхательных путей. Усиливает бронхолитический эффект теофиллина.

Особые указания

С первых дней приема препарата, вследствие улучшения выведения секрета, усиливается отхаркивающий эффект. Флуифорт сироп содержит сахарозу. Это должны принимать во внимание пациенты, придерживающиеся гипокалорийной диеты и больные сахарным диабетом. При сопутствующем сахарном диабете необходимо учитывать содержание сахарозы в сиропе: 5,25 г на 1 столовую ложку в сиропе для взрослых и 3,5 г на 1 чайную ложку в сиропе для детей. Лечение можно сочетать с физиотерапевтическими процедурами. Применение Флуифорта не ведет к возникновению привыкания или метаболической зависимости.