Инструкция по применению
Флутамид Таблетки 250 мг 90 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: ТЕВА
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Флутамид
Количество в упаковке: 90
Дозировка действующего вещества: 250 мг

Описание

Таблетки бледно-желтого цвета, круглые, двояковыпуклые.

Действующее вещество

Флутамид

Состав

Флутамид, лактозы моногидрат - 150 мг, целлюлоза микрокристаллическая - 50 мг, крахмал кукурузный - 30 мг, натрия лаурилсульфат - 10 мг, кремния диоксид коллоидный - 5 мг, магния стеарат - 5 мг.

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

После приема внутрь быстро и полностью всасывается из ЖКТ. Связывание с белками плазмы составляет 94-96%. После многократного приема внутрь в дозе 250 мг 3 раза /сут равновесная концентрация флутамида и его активного метаболита в плазме крови достигалась после 4-й дозы. Метаболизируется с образованием активного метаболита гидроксифлутамида и 5 других метаболитов. Выводится в основном с мочой, 4.2% дозы выводится с калом в течение 72 ч. T1/2 гидроксифлутамида составляет 6 ч. У пациентов пожилого возраста T1/2 составляет 8 ч после однократного введения и 9.6 ч - при равновесной концентрации.

Показания

Лечение метастазирующего рака предстательной железы, когда показано подавление действия тестостерона: в начале лечения в комбинации с агонистами ГнРГ, в качестве дополнительного лечения больных, уже получающих терапию агонистами ГнРГ, у больных с хирургической кастрацией, лечение больных, у которых другие виды гормонотерапии были неэффективными или при непереносимости подобного лечения.

Способ применения и дозы

Способ применения и режим дозирования конкретного препарата зависят от его формы выпуска и других факторов. Оптимальный режим дозирования определяет врач. Следует строго соблюдать соответствие используемой лекарственной формы конкретного препарата показаниям к применению и режиму дозирования.

Противопоказания

повышенная чувствительность к флутамиду или к любому другому компоненту препарата, выраженная печеночная недостаточность, детский возраст (безопасность и эффективность не установлена). С осторожностью: у больных со сниженной функцией печени, со склонностью к тромбозам и при сердечно-сосудистых заболеваниях, а также при состояниях, предрасполагающих к интоксикации анилином (один из метаболитов флутамида метиланилиновое производное): дефицит глюкозо-6-фосфат дегидрогеназы, курение, гемоглобинопатия (М-гемоглобин).

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказано применение при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

Взаимодействие с другими препаратами

Полагают, что возможно лекарственное взаимодействие при одновременном применении флутамида с парацетамолом, опиоидными анальгетиками, НПВС.

Особые указания

Лечение Флутамидом следует про водить под контролем уровня печеночных ферментов в сыворотке крови (соответствующие лабораторные анализы следует проводить 1 раз в месяц в течение первых 4-х месяцев и далее регулярно). В случае повышения уровня печеночных ферментов в 2-3 раза по сравнению с верхним пределом нормальных значений и/или появления желтухи в отсутствии метастазов в печени применение Флутамида следует прекратить. Больные должны получить рекомендацию незамедлительно обратиться к врачу при появлении первых симптомов нарушения функции печени, таких, как кожный зуд, потемнение мочи, тошнота, рвота, стойкая потеря аппетита, желтушность кожных покровов или склер, болезненные ощущения в правом подреберье или гриппоподобные симптомы.