Инструкция по применению
Фокус форте таблетки 30 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Русфик
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Аскорбиновая кислота
Количество в упаковке: 30



Описание

Аскорбиновая кислота является активным веществом препарата Витамин С.

Действующее вещество

Аскорбиновая кислота

Состав

Витамин В2, С, Е, А, бета-каротин, меди цитрат, цинка цитрат, селенит натрия, зеаксантин, лютеин, экстракт черники, Е460i, Е468, Е553iii, Е464,мальтодекстрин, Е551, Е1520,Е470, Е120, красители Е153, Е133.

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

Абсорбируется в желудочно - кишечном тракте (ЖКТ) (преимущественно в тощей кишке). С увеличением дозы до 200 мг всасывается до 140 мг (70%), при дальнейшем повышении дозы всасывание уменьшается (50-20%). Связь с белками плазмы - 25%. Заболевания ЖКТ (язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, запоры или диарея, глистная инвазия, лямблиоз), употребление свежих фруктовых и овощных соков, щелочного питья уменьшают всасывание аскорбата в кишечнике.Концентрация аскорбиновой кислоты в плазме в норме составляет приблизительно 10-20 мкг/мл, запасы в организме - около 1.5 г при приеме ежедневных рекомендуемых доз и 2.5 г при приеме 200 мг/сут., время достижения максимальной концентрации после приема внутрь - 4 ч.Легко проникает в лейкоциты, тромбоциты, а затем - во все ткани, наибольшая концентрация достигается в железистых органах, лейкоцитах, печени и хрусталике глаза, депонируется в задней доле гипофиза, коре надпочечников, глазном эпителии, межуточных клетках семенных желез, яичниках, печени, селезенке, поджелудочной железе, легких, почках, стенке кишечника, сердце, мышцах, щитовидной железе, проникает через плаценту. Концентрация аскорбиновой кислоты в лейкоцитах и тромбоцитах выше, чем в эритроцитах и в плазме. При дефицитных состояниях концентрация в лейкоцитах снижается позднее и более медленно и рассматривается как лучший критерий оценки дефицита, чем концентрация в плазме. Метаболизируется преимущественно в печени в дезоксиаскорбиновую и далее в щавелевоуксусную и дикетогулоновую кислоты.Выводится почками, через кишечник, с потом, грудным молоком в виде неизмененного аскорбата и метаболитов.При назначении высоких доз скорость выведения резко усиливается. Курение и употребление этанола ускоряют разрушение аскорбиновой кислоты (превращение в неактивные метаболиты), резко снижая запасы в организме.Выводится при гемодиализе.

Показания

Для реализации населению в качестве биологически активной добавки к пище - дополнительного источника витаминов А, Е, С, В2, меди, цинка, селена, источника каротиноидов (бета-каротина, зеаксантина, лютеина) и антоцианов.

Способ применения и дозы

Взрослым и детям старше 14 лет по 1 таблетке 1 раз в день во время еды. Продолжительность приема - 1 месяц.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке, в сухом и недоступном для детей месте, при температуре не выше 25°C.