Инструкция по применению
Фолибер таблетки 28 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Италия
Производитель: ИТАЛФАРМАКО
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Поливитамины
Количество в упаковке: 28

Описание

Плоские, круглые, жёлтые таблетки.

Действующее вещество

Поливитамины

Состав

Каждая таблетка содержит:Активные вещества: фолиевая кислота – 0.4 мг, цианокобаламин (Витамин B12) – 0.002 мг.Вспомогательные вещества: карбоксиметилкрахмал натрия (Тип А), магния стеарат, лактозы моногидрат, целлюлоза микрокристаллическая, тринатрия цитрат, лимонная кислота, мальтодекстрин.

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

Фолиевая кислота быстро всасывается в тощей кишке, подвергаясь восстановлению и метилированию до 5 метилтетрагидрофолата, который присутствует в портальном кровообращении.Максимальная концентрация в плазме наблюдается через 30-60 минут. С другой стороны, витамин B12 может всасываться после взаимодействия его в желудке с «внутренним факторомКасла», гликопротеином, который секретируется париетальными клетками желудка.Максимальная концентрация в плазме наблюдается через 8-12 часов. Как и в случае фолиевой кислоты, витамин B12 подвергается значительной кишечно-печёночной рециркуляции.Оба компонента в значительной степени связываются с белками плазмы, избыток накапливается в печени. Ежедневно 4-5 мкг фолатов выводится с мочой в форме фолиевой кислоты, 10-формилтетрагидрофолата и 5-метилтетрагидрофолата. Фолат также выводится с материнским молоком.Средний период полувыведения витамина B12 составляет около 6 дней. Часть введённой дозы выводится с мочой в течение первых 8 часов, хотя большая часть выводится с желчью. 25% выводится с калом. Кроме того, витамин B12 проникает через плаценту и присутствует в материнском молоке.

Показания

Профилактика дефицита фолиевой кислоты и витамина B12 (цианокобаламина) у женщин детородного возраста на этапах планирования беременности (неменее 1 месяца до зачатия), и I-ый триместр беременности для профилактики развития дефектов нервной трубки у плода.

Способ применения и дозы

По 1 таблетке в день, до еды.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции.

Взаимодействие с другими препаратами

Препарат м, поскольку он действует в качестве антагониста фолиевой кислоты, ингибируя фермент гидрофолатредуктазу.Приём препарата Фолибер в сочетании с противоэпилептическими препаратами из группы гидантоина может уменьшить эффект последних.

Особые указания

Препарат не влияет на способность управлять автомобилем и работать с механизмами.

Условия хранения

В сухом месте, при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.