Инструкция по применению
Формидрон Раствор спиртовой 50 мл

Характеристики

Форма выпуска: Раствор
Страна: Россия
Производитель: Тульская ФФ
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Формальдегид
Количество в упаковке: 1
Срок годности: 36.0



Описание

Бесцветная прозрачная жидкость с ароматным запахом.

Действующее вещество

Формальдегид

Состав

Действующее вещество: Формалин (формальдегида 36,5 % - 37,5 %, что эквивалентно 3,7 г формальдегида) - 10,0 г Вспомогательные вещества: Этанол (Спирт этиловый) 95 % - 39,5 г Вода очищенная - 50,0 г Одеколон-0,5 г.

Форма выпуска

Раствор

Показания

Повышенное потоотделение.

Способ применения и дозы

Наружно, рекомендуется протирать межпальцевые складки ног небольшим количеством жидкости 1 раз в день. На участки кожи с повышенной потливостью (подошвы, ладони, межпальцевые складки) после гигиенического душа и высушивания препарат наносят на 30-40 мин. Затем препарат смывают теплой водой. На нежную чувствительную кожу (подмышечные впадины и ладони у женщин) препарат нужно наносить на срок не более 20 мин. После этого кожу следует тщательно вымыть теплой водой без моющих средств и припудрить тальком или детской присыпкой. После бритья подмышечных впадин Формидрон можно наносить не ранее, чем через сутки. Одной процедуры достаточно, чтобы снизить потливость кожи на 7-12 дней. При резко выраженной потливости процедуру проводят 2-3 дня подряд.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к формальдегиду и другим компонентам препарата, воспалительные заболевания кожи, детский возраст до 16 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

Нет данных.

Побочные действия

Аллергические реакции, местные реакции в виде покраснения кожи и зуда. При длительном использовании - сухость кожи. В этом случае применение препарата прекращают. Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

До настоящего времени сведений о случаях передозировки при применении препарата не поступало.

Взаимодействие с другими препаратами

Не изучалось.

Особые указания

Раствор не следует наносить на лицо и слизистые оболочки.Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:Применение препарата в соответствии с инструкцией не влияет на управление транспортными средствами и занятие потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Условия хранения

В сухом месте