Инструкция по применению
Формидрон Раствор для наружного применения спиртовой 50 мл

Характеристики

Форма выпуска: Раствор для наружного применения
Страна: Россия
Производитель: Ярославская ФФ
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Формальдегид
Количество в упаковке: 1



Описание

Бесцветная прозрачная жидкость с ароматным запахом.

Действующее вещество

Формальдегид

Состав

Состав на 100 г: _Действующее вещество_: Раствор формальдегида - 10,0 г _Вспомогательные вещества_: Спирта этилового (этанола) 95% - 39,5 г, Воды очищенной - 50,0 г, Одеколона - 0,5 г.

Форма выпуска

Раствор для наружного применения

Показания

Повышенное потоотделение.

Способ применения и дозы

Наружно. Протирают участки повышенной потливости 1 раз в сутки.

Противопоказания

Гиперчувствительность, воспалительные заболевания кожи.

Применение при беременности и кормлении грудью

После консультации с врачом возможно применение препарата в соответствии с инструкцией, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный, риск для плода и ребенка.

Побочные действия

Аллергические реакции, местные реакции в виде покраснения кожи и зуда.

Передозировка

Не выявлено.

Взаимодействие с другими препаратами

Не выявлено.

Особые указания

Раствор не следует наносить на лицо и слизистые оболочки. Применение препарата в соответствии с инструкцией не влияет на управление транспортными средствами и занятия потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Условия хранения

При температуре не выше плюс 25 °С и не ниже минус 20 °С. Хранить в недоступном для детей месте.