Инструкция по применению
Фороза Таблетки покрытые пленочной оболочкой 70 мг 4 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Словения
Производитель: Сандоз
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Алендроновая кислота
Количество в упаковке: 4
Дозировка действующего вещества: 70 мг



Действующее вещество

Алендроновая кислота

Состав

Алендроната натрия тригидрат 91.35 мг, что соответствует содержанию алендроновой кислоты 70 мг Вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая, кремния диоксид коллоидный безводный, кроскармеллоза натрия, магния стеарат. Состав оболочки: Lustre Clear LC 103 (целлюлоза микрокристаллическая, каррагинан, макрогол 8000).

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Лечение остеопороза у женщин в постменопаузе, в т.ч. для снижения риска компрессионных переломов позвоночника и переломов шейки бедра . — лечение остеопороза у мужчин с целью предупреждения переломов . — лечение остеопороза, вызванного длительным применением ГКС.

Способ применения и дозы

Таблетки следует принимать утром, не позднее, чем за 30 мин до первого приема пищи, напитка или другого лекарственного препарата, запивая полным стаканом обычной воды (не менее 200 мл). Таблетки нельзя разжевывать. Не следует принимать горизонтальное положение тела, по крайней мере, в течение 30 мин после приема препарата. Нельзя принимать препарат перед сном или до утреннего подъема с постели. Рекомендуемая доза составляет 70 мг (1 таб.) 1 раз в неделю. Для пожилых пациентов и пациентов с умеренным нарушением функции почек (КК более 35 мл /мин) коррекции дозы не требуется

Противопоказания

Стриктуры или ахалазии пищевода и другие состояния, приводящие к замедлению продвижения пищи по пищеводу . — неспособность пациента стоять или сидеть на протяжении 30 мин . — гипокальциемия . — почечная недостаточность тяжелой степени (КК менее 35 мл/мин) . — тяжелые нарушения минерального обмена . — беременность . — период лактации (грудного вскармливания) . — детский возраст (эффективность и безопасность применения не установлены) . — повышенная чувствительность к алендронату или другим компонентам препарата. С осторожностью следует назначать препарат пациентам с заболеваниями ЖКТ (дисфагия, гастрит, дуоденит, язвенная болезнь в стадии обострения, активное желудочно-кишечное кровотечение или хирургическая операция на верхних отделах ЖКТ в анамнезе), гиповитаминоз D. Применение при нарушениях функции почек Для пациентов с умеренным нарушением функции почек (КК более 35 мл/мин) коррекции дозы не требуется. При КК менее 35 мл/мин применение препарата противопоказано. Применение у пожилых пациентов Для пожилых пациентов коррекции дозы не требуется

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказано применение при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

Побочные действия

При приме таблеток Фороза могут наблюдаться следующие Побочное реакции: абдоминальные боли . жидкий стул или запор . вздутие живота . нарушение глотания . изжога . воспаление слизистой желудка . тошнота и рвота . стеноз и перфорация пищевода . язвы на слизистых ЖКТ . эзофагит . кровотечение из верхних участков пищеварительного тракта . дегтеобразный стул . головные боли . головокружение . изменение вкуса . раздражительность . склерит . увеит . конъюнктивит . кожная аллергия . выпадение волос . фоточувствительность . миалгия . боль в костях . артралгия . остеонекроз челюсти . атипичные переломы бедра . отечность суставов . понижение уровня кальция и фосфора в крови

Особые указания

При приме таблеток Фороза могут наблюдаться следующие Побочное реакции: абдоминальные боли . жидкий стул или запор . вздутие живота . нарушение глотания . изжога . воспаление слизистой желудка . тошнота и рвота . стеноз и перфорация пищевода . язвы на слизистых ЖКТ . эзофагит . кровотечение из верхних участков пищеварительного тракта . дегтеобразный стул . головные боли . головокружение . изменение вкуса . раздражительность . склерит . увеит . конъюнктивит . кожная аллергия . выпадение волос . фоточувствительность . миалгия . боль в костях . артралгия . остеонекроз челюсти . атипичные переломы бедра . отечность суставов . понижение уровня кальция и фосфора в крови