
Инструкция по применению
Фосамакс таблетки 70 мг 4 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Нидерланды
Производитель: МСД ФАРМАСЬЮТИКАЛС
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Алендроновая кислота
Количество в упаковке: 4
Дозировка действующего вещества: 70 мг
Срок годности: 24.0

Действующее вещество

Алендроновая кислота

Состав

Состав на один флакон: Активное вещество: Октреотида ацетат в пересчете на октреотид 10,0 вспомогательные вещества: DL-молочной и гликолевой кислот сополимер 270,0 мг, D-Маннитол 85,0 мг, кармеллоза натрия 30,0 м, полисорбат-80 2,0 Растворитель для приготовления суспензии - Маннит, раствор 0,8 % Состав на 1 мл: D-Маннитол 8,0 мг Вода для инъекций до 1,0 мл

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

При приеме натощак за 2 ч до приема пищи биодоступность составляет 0,64%, если прием препарата осуществляется за 1 ч до завтрака, то биодоступность снижается на 40%. Одновременный прием кофе снижает биодоступность на 60%. Прием Преднизолона не оказывает влияния на биодоступность препарата. Связывание с белками составляет 78%. После в/в ведения в крови через 6 ч концентрация снижается на 95%. С мочой выводится50% препарата. Конечный период полувыведения - 10 лет.

Показания

Постменопаузальный остеопороз у женщин (предупреждение развития переломов, в частности бедренной кости, компрессионных переломов позвоночника); профилактика развития остеопороза при риске его возникновения у женщин в период менопаузы (снижение вероятности возникновения переломов); терапия остеопороза у мужчин (предупреждение развития переломов); лечение индуцированного глюкокортикоидами остеопороза; терапия костной болезни Педжета

Способ применения и дозы

Принимается внутрь, раз в сут. желательно утром, не разжевывая, за 2 ч до приема пищи. Запивать таблетку необходимо только водой, поскольку прочие напитки снижают абсорбцию. При болезни Педжета- 40 мг не менее 6 мес. Для профилактики остеопороза назначают 5 мг/сут. При остеопорозе в постменопаузе - 10 мг/сут. Имеется форма выпуска в таблетках по 70 мг, которые принимают 1 раз в неделю. Для еженедельного приема также есть комбинированный препарат с витамином D. Прием 10 мг препарата по результативности и появлению побочных реакций эквивалентен еженедельному приему по 70 мг. Инструкция по применению Фосамакса содержит предупреждение о том, что с целью уменьшения раздражающего действия препарата на пищевод необходимо принять таблетку утром, запивая стаканом воды, после чего нельзя ложиться в течение 30 мин. Если принять таблетку перед сном, увеличивается риск появления эзофагита и прочих заболеваний пищевода. Лечение необходимо сочетать с диетой, богатой солями Ca2+.

Противопоказания

Заболевания верхних отделов ЖКТ (ахалазия, дисфагия, стриктуры пищевода, дуоденит, язвенная болезнь); гипокальциемия (гипопаратиреоидизм, мальабсорбция кальция, дефицит витамина D); беременность, кормление грудью; детский возраст; выраженное нарушение функции почек; повышенная чувствительность к препарату

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказано

Побочные действия

• Крапивница, сыпь, зуд, редко - ангионевротический отек; • головокружение, вертиго; • боль в костях, миалгия, артралгия; • астения; • периферические отеки; • эзофагит, язвы пищевода, ротоглотки, желудка.

Передозировка

Проявляется симптомами: гипокальциемия, гипофосфатемия, осложнения со стороны ЖКТ (диспепсия, изжога, гастрит, эзофагит, язвы желудка и пищевода). Специфической терапии не существует. Для связывания алендроната принять молоко или антациды. Не следует вызывать рвоту

Взаимодействие с другими препаратами

При совместном применении с антацидами, препаратами кальция отмечается нарушение всасывания алендроната, поэтому необходимо прием этих препаратов разносить по времени. Ранитидин повышает биодоступность Фосамакса в 2 раза. Нежелательные явления со стороны ЖКТ увеличивается, если Фосамакс принимать вместе с ацетилсалициловой кислотой и другими НПВП. При совместном применении с эстрогенами безопасность лечения соответствует безопасности при применении каждого препарата самостоятельно

Особые указания

При применении Фосамакса и аналогов существует риск поражения верхних отделов ЖКТ. Пациенты должны быть предупреждены о таком риске. При появлении характерной симптоматики необходима медицинская помощь. Риск развития тяжелого поражения ЖКТ существенно выше у пациентов, нарушающих рекомендации по применению Фосамакса или продолжающих его прием после появления первых симптомов поражения слизистой ЖКТ. При случайном пропуске очередного приема Фосамакса (в режиме 1 таблетка в неделю) следующую таблетку рекомендуется принять ближайшим утром. В последующем рекомендовано вернуться к выбранному графику приема препарата. Нельзя принимать 2 таблетки в один день. Фосамакс используется исключительно по назначению врача и под строгим врачебным контролем.