Инструкция по применению
Фосфоглицеризин Капсулы 50 шт

Характеристики



Форма выпуска: Капсулы
Страна: Россия
Производитель: Вифитех
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Глицирризиновая кислота+Фосфолипиды
Количество в упаковке: 1

Описание

Капсулы непрозрачные твердые желатиновые № 0 с корпусом белого цвета и крышечкой желтого цвета. Содержимое капсул- гранулированный порошок от белого со слегка желтоватым оттенком до светло-желтого цвета со слабым характерным запахом, допускается комкование.

Действующее вещество

Глицирризиновая кислота+Фосфолипиды

Состав

1 капсула содержит: Действующие вещества: фосфолипиды (фосфолипиды сои С 80) (в пересчете на Фосфатидилхолин)- 0,0650 г, натрия глицирризинат (тринатриевая соль глицирризиновой кислоты) в пересчете на 100% вещество- 0,0350 г. Вспомогательные вещества: кальция карбонат- 0,2047 г, тальк- 0,0077 г, кремния диоксид коллоидный (аэросил)- 0,0055 г, кальция стеарат- 0,0009 г, целлюлоза микрокристаллическая (тип 102)- до достижения массы содержимого капсулы 0,460 г. Состав оболочки капсулы Корпус: титана диоксид- 2,000%, желатин- до 100%. Крышечка: краситель солнечный закат желтый- 0,002%, краситель хинолиновый желтый- 0,250%, титана диоксид- 0,990%, желатин- до 100%.

Форма выпуска

Капсулы

Фармакокинетика

Глицирризиновая кислота После перорального приема в кишечнике под влиянием фермента #-глюкуронидазы, продуцируемого бактериями нормальной микрофлоры, из глицирризиновой кислоты образуется активный метаболит- #-глицирретовая кислота, которая всасывается в системный кровоток. В крови #-глицирретовая кислота связывается с альбумином и практически полностью транспортируется в печень. Выделение #-глицирретовой кислоты происходит преимущественно с желчью, в остаточном количестве- с мочой. По экспериментальным данным, фосфолипиды улучшают липофильные свойства глицирризиновой кислоты, увеличивая интенсивность и скорость ее всасывания более чем в 2 раза. Фосфатидилхолин Более 90% принятых внутрь фосфолипидов всасывается в тонкой кишке. Большая часть их расщепляется фосфолипазой А до 1-ацетил-лизофосфатидилхолина, 50% которого подвергается обратному ацетилированию в полиненасыщенный Фосфатидилхолин в процессе всасывания в слизистой оболочке кишечника. Полиненасыщенный Фосфатидилхолин с током лимфы попадает в кровь, откуда, главным образом, в связанном с липопротеинами высокой плотности виде поступает в печень. Фармакокинетика у людей изучалась с помощью диленолеил фосфатидилхолина с радиоактивной меткой- 3Н (холиновая часть) и 14С (остаток линолевой кислоты). Максимальная концентрация 3Н достигается через 6-24 часа, составляя 19,9% от назначенной дозы, 14С- через 4-12 часов, составляя 27,9%. Период полувыведения холинового компонента равен 66 часам, остатка линолевой кислоты- 32 часам. В кале обнаруживается 2% 3Н и 4,5%- 14С, в моче 6% 3Н и минимальное количество 14С. Оба изотопа всасываются в кишечнике более чем на 90%.

Показания

Жировая дегенерация печени (гепатоз), алкогольные, токсические, в том числе лекарственные, поражения печени. в составе комплексной терапии вирусных гепатитов, цирроза печени и псориаза.

Способ применения и дозы

Внутрь во время еды, не разжевывая, запивая небольшим количеством жидкости. Рекомендуемый режим дозирования у взрослых и детей старше 12 лет- по 2 капсулы 3 раза в сутки. Длительность применения может составлять до 6 месяцев, в среднем- 3 месяца.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к глицирризиновой кислоте, фосфатидилхолину и другим компонентам препарата, антифосфолипидный синдром, беременность (данных по эффективности и безопасности недостаточно), период грудного вскармливания (данных по эффективности и безопасности недостаточно), детский возраст до 12 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

Препарат противопоказан при беременности и в период грудного вскармливания (данных по эффективности и безопасности недостаточно).

Побочные действия

Препарат хорошо переносится, побочные эффекты развиваются очень редко. Аллергические реакции: кожная сыпь, затруднение носового дыхания, конъюнктивит, кашель. Со стороны сердечно-сосудистой системы: транзиторное (преходящее) повышение артериального давления, периферические отеки. Со стороны системы пищеварения: диспепсия (отрыжка, тошнота, вздутие живота), дискомфорт в животе. Если любые из указанных побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, неуказанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

Случаев передозировки не зарегистрировано. Глицирризиновая кислота, входящая в состав препарата, в больших дозах может вызвать псевдокортикостероидный эффект, который заключается в повышении уровня глюкокортикоидов и минералокортикоидов в крови. Это приводит к задержке натрия и уменьшению калия в организме, и, как следствие, к повышению артериального давления, задержке жидкости в организме. Глицират, применяемый внутрь в течение длительного периода (более 6 недель), может вызвать симптомы интоксикации: головную боль, летаргию, повышенное давление, отеки, выведение калия из организма.

Взаимодействие с другими препаратами

Глицирризиновая кислота, входящая в состав препарата, является синергистом кортикостероидных гормонов, она усиливает и продлевает их действие.

Особые указания

Препарат содержит активный компонент тринатриевую соль глицирризиновой кислоты. Глицирризиновая кислота (глицират) выделяется из экстракта корней солодки (лакричника), относится к стероидным сапонинам. Применение глицирризиновой кислоты в дозах, превышающих терапевтические, приводит к серьезным побочным эффектам. В случае повышения артериального давления следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу.Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера, оператора).

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.