Инструкция по применению
Фосфоглицерр Капсулы 50 шт

Характеристики

Форма выпуска: Капсулы
Страна: Россия
Производитель: Вифитех
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Фосфолипиды+Натрия глицирризинат
Количество в упаковке: 50



Описание

Капсулы непрозрачные, твердые, желатиновые № 0 с корпусом белого цвета и крышечкой желтого цвета, содержимое капсул - гранулированный порошок от белого со слегка желтоватым оттенком до светло-желтого цвета со слабым характерным запахом, допускается комкование.

Действующее вещество

Фосфолипиды+Натрия глицирризинат

Состав

1 капс ула содержит:фосфолипиды 0.065 гнатрия глицирризинат 0.035 гВспомогательные вещества: кальция карбонат - 0.2047 г, тальк - 0.0077 г, кремния диоксид коллоидный (аэросил) - 0.0055 г, кальция стеарат - 0.0009 г, целлюлоза микрокристаллическая (тип 102) - 0.46 г.Состав оболочки капсулы:Корпус: титана диоксид - 2%, желатин - до 100%.Крышечка: краситель солнечный закат желтый - 0.002%, краситель хинолиновый желтый - 0.25%, титана диоксид - 0.99%, желатин - до 100%.

Форма выпуска

Капсулы

Фармакокинетика

Компоненты данной комбинации хорошо всасываются в тонком кишечнике как в виде исходной молекулы, так и биологически активных продуктов их гидролиза пищеварительными ферментами (ненасыщенные жирные кислоты, глицерин, неорганический фосфат и холин, глицирретовая кислота), которые транспортируются через стенку кишечника в лимфатическое русло, легко проникают в печень, легкие, кожу, другие органы.В печени происходит частичный ресинтез фосфатидилхолина из продуктов гидролиза.

Показания

В составе комплексной терапии: острый и хронический гепатит, жировой гепатоз и другие дегенеративные поражения печени, лекарственные и алкогольные поражения печени, цирроз печени, интоксикации, псориаз, нейродермит, экзема.

Способ применения и дозы

Внутрь, по 2 капс. (таб.) 3-4 раза в сут, во время еды, запивая небольшим количеством воды.В/в медленно. Разовую дозу вводят 2 раза/сут (утром и вечером) в течение 10 дней с последующим переходом на пероральный прием.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам комбинации.

Побочные действия

Аллергические реакции: кожная сыпь.

Условия хранения

В сухом, защищенном от света месте при температуре от 10 до 30° С. Хранить в недоступном для детей месте