Инструкция по применению
Фромилид уно Таблетки 500 мг 5 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Словения
Производитель: КРКА
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Кларитромицин
Количество в упаковке: 5
Дозировка действующего вещества: 500 мг



Действующее вещество

Кларитромицин

Состав

1 таб. кларитромицин 500 мг.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Фармакокинетика

Способ применения и дозы

Фармакологическое действие

Противопоказания

Инфекционно-воспалительные заболевания, вызванные чувствительными к препарату микроорганизмами: — инфекции верхних дыхательных путей и ЛОР-органов (тонзиллит, фарингит, синусит, острый средний отит) . — инфекции нижних дыхательных путей (бронхит, внебольничная пневмония) . — инфекции кожи и мягких тканей (в т.ч. фолликулит, рожа).

Побочные действия

Препарат принимают внутрь, во время еды. Таблетки следует проглатывать целиком, не разламывая и не разжевывая. Взрослым назначают в дозе 500 мг (1 таб.) 1 раз/сут. При тяжелых инфекциях: 1000 мг (2 таб.) 1 раз/сут. Курс лечения составляет 5-14 дней, при внебольничной пневмонии и синусите - 6-14 дней. У пациентов пожилого возраста нет необходимости изменять дозу кларитромицина, кроме случаев выраженных нарушений функции почек. Не следует применять Фромилид уно при КК меньше 30 мл/мин. У пациентов с печеночной недостаточностью коррекция дозы не требуется.

Особые указания

Препарат принимают внутрь, во время еды. Таблетки следует проглатывать целиком, не разламывая и не разжевывая. Взрослым назначают в дозе 500 мг (1 таб.) 1 раз/сут. При тяжелых инфекциях: 1000 мг (2 таб.) 1 раз/сут. Курс лечения составляет 5-14 дней, при внебольничной пневмонии и синусите - 6-14 дней. У пациентов пожилого возраста нет необходимости изменять дозу кларитромицина, кроме случаев выраженных нарушений функции почек. Не следует применять Фромилид уно при КК меньше 30 мл/мин. У пациентов с печеночной недостаточностью коррекция дозы не требуется.