Инструкция по применению
Фторокорт Мазь для наружного применения 15 г

Характеристики

Форма выпуска: Мазь
Страна: Венгрия
Производитель: Гедеон Рихтер
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Триамцинолон
Количество в упаковке: 1
Срок годности: 24



Действующее вещество

Триамцинолон

Состав

Триамцинолона ацетонид 1 мг.Вспомогательные вещества: метилпарагидроксибензоат, стеариновая кислота, полисорбат 60, цетиловый спирт, парафин жидкий, глицерол 85%, вода очищенная.

Форма выпуска

Мазь

Фармакокинетика

Триамцинолон плохо всасывается при наружном применении и не оказывает существенного системного действия. Нарушение целостности кожных покровов или окклюзионная повязка могут повысить всасывание триамцинолона.

Показания

— экзема;— атопический дерматит (нейродермит);— псориаз;— дерматиты различной этиологии (в т.ч. аллергические);— фотодерматозы;— гипертрофические и келоидные рубцы;— красный плоский лишай;— дискоидная красная волчанка;— укусы насекомых.

Способ применения и дозы

Наружно. Мазь наносят на пораженные участки кожи тонким слоем 2-3 раза/сут (не более 15 г/сут).Мазь можно применять под окклюзионную повязку при лихенифицированных проявлениях (не более 10 г/сут).Курс лечения - обычно 5-10 дней, при упорном течении - до 25 дней, не рекомендуется применение более 4 недель.

Противопоказания

— бактериальные, вирусные и грибковые заболевания кожи;— туберкулез кожи;— кожные проявления сифилиса;— периоральный дерматит;— опухоли и предраковые заболевания кожи;— повышенная чувствительность.

Применение при беременности и кормлении грудью

Не рекомендуется применять при беременности и в период лактации.

Побочные действия

Местные реакции: возможно развитие эритемы, гипертрихоза, развитие вторичных инфекционных поражений (присоединение бактериальной и грибковой инфекции). При длительном применении или нанесении на обширные участки кожи возможны системные побочные эффекты, характерные для ГКС и атрофические изменения кожи. Возможны аллергические реакции.

Взаимодействие с другими препаратами

Действие пероральных ГКС на фоне местного применения триамцинолона усиливается.

Особые указания

Не рекомендуется наносить на большие поверхности, избегать длительного применения у детей независимо от возраста.Не применять в офтальмологии, не наносить на кожу лица.Для профилактики местных инфекционных осложнений возможно применение в сочетании с противомикробными средствами.

Условия хранения

Беречь от детей