**Инструкция по применению**
**Фтортиазинон Таблетки 300 мг 14 шт**

### Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: НИИЭМ Им.Гамалеи
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Фтортиазинон
Количество в упаковке: 14
Дозировка действующего вещества: 300 мг




### Описание

Препарат представляет собой таблетки. Круглые двояковыпуклые таблетки от почти белого до желтого цвета, допускаются желтые и черные вкрапления.

### Действующее вещество

Фтортиазинон

### Состав

Препарат Фтортиазинон содержит: Действующим веществом является фтортиазинон. Каждая таблетка содержит 300 мг фтортиазинона. Вспомогательные вещества: Целлюлоза микрокристаллическая Лактозы моногидрат Карбоксиметилкрахмал натрия Поливиниловый спирт Натрия лаурилсульфат Магния стеарат Макрогол 6000.

### Форма выпуска

Таблетки

### Показания

Препарат Фтортиазинон в комбинации с цефепимом показан к применению у взрослых от 18 лет для лечения осложненных инфекций мочевыводящих путей, вызванных штаммами микроорганизмов Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae. Применение Фтортиазинона без одновременного введения цефепима на пациентах не изучалось.

**Способ применения и дозы**

Всегда принимайте препарат Фтортиазинон в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом. Рекомендуемая доза Рекомендуемая доза препарата Фтортиазинон составляет 600 мг (2 таблетки по 300 мг) 2 раза в день. Суточная доза препарата Фтортиазинон составляет 1200 мг. Путь и способ введения Препарат Фтортиазинон предназначен для приема внутрь. Таблетку необходимо проглатывать целиком, запивая достаточным количеством воды, через 30 минут после приема пищи. Интервал между приемами препарата Фтортиазинон составляет 12 часов. Продолжительность терапии Продолжительность лечения зависит от характера течения заболевания и вида инфекции и составляет 7 – 14 дней.

**Противопоказания**

Не принимайте препарат Фтортиазинон: - если у Вас аллергия на Фтортиазинон или на любые другие компоненты препарата, перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша, Следует учитывать противопоказания, указанные в листке-вкладыше или инструкции по медицинскому применению цефепима.

**Применение при беременности и кормлении грудью**

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что можете быть беременны, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом. Беременность Не принимайте препарат Фтортиазинон, если Вы беременны или можете забеременеть (не используете контрацепцию). Если Вы можете забеременеть, необходимо использовать надежные средства контрацепции во время терапии препаратом Фтортиазинон и не менее недели после завершения терапии. Грудное вскармливание При необходимости применения препарата Фтортиазинон рекомендуется приостановить грудное вскармливание. Нет данных

**Побочные действия**

Подобно всем лекарственным препаратам, препарат Фтортиазинон может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех. Немедленно сообщите врачу, если у Вас возникнут какие-либо из следующих нежелательных реакций при приеме препарата Фтортиазинон: - если у Вас учащенное сердцебиение (синусовая тахикардия), что может быть нечасто, - если у Вас замедление частоты сердечных сокращений (синусовая брадикардия), что может быть нечасто. Другие возможные нежелательные реакции, которые могут наблюдаться при приеме препарата Фтортиазинон Часто (не более чем у 1 человека из 10): - головная боль, - понос (диарея), - повышение уровня мочевины, повышение уровня креатинфосфокиназы, повышение уровня аспартатаминотрансферазы, снижение уровня гемоглобина определяются по результатам анализов крови. Нечасто (не более чем у 1 пациента из 100): - тошнота, - насморк (ринорея), - запор, - рвота, - боль в верхних отделах живота, - нарушение пищеварения (диспепсия), - боль в животе, - зуд во влагалище (вульвовагинальный зуд), - повышение белка в моче (определяется по результатам анализов крови), - инфекция, обусловленная грибами рода Candida, - повышение уровня аланинаминотрансферазы, повышение уровня скорости оседания эритроцитов (СОЭ), повышение уровня билирубина в крови, снижение числа тромбоцитов, снижение относительного содержания гранулоцитов, повышение уровня щелочной фосфатазы в крови, повышение уровня креатинина в крови (определяются по результатам анализов крови). Сообщения о подозреваемых нежелательных реакциях Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях в информационную базу данных по нежелательным реакциям напрямую через РОСЗДРАВНАДЗОР. Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

**Передозировка**

Если Вы получили препарат Фтортиазинон больше, чем следовало Лечение препаратом Фтортиазинон назначается и контролируется врачом, поэтому вероятность того, что Вы получите его больше или меньше, чем нужно, минимальна. Однако, если у Вас возникнут какие-либо сомнения, проконсультируйтесь с лечащим врачом. Если Вы забыли принять препарат Фтортиазинон Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную. Однако, если у Вас возникнут какие-либо сомнения, проконсультируйтесь с лечащим врачом. При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу.

**Взаимодействие с другими препаратами**

Сообщите лечащему врачу о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты.

**Особые указания**

# Данный лекарственный препарат подлежит дополнительному мониторингу, который способствует быстрому выявлению новых сведений о безопасности. Вы можете помочь, сообщая информацию о любых нежелательных реакциях, которые возникли в период применения лекарственного препарата (в том числе и о случаях его неэффективности). Способ сообщения о нежелательных реакциях описан в разделе 4 листка-вкладыша. Препарат Фтортиазинон содержит лактозу Если у Вас непереносимость некоторых сахаров, обратитесь к лечащему врачу перед приемом данного лекарственного препарата. Влияние препарата Фтортиазинон на способность управлять транспортными средствами не изучалось. Проконсультируйтесь с лечащим врачом, если Вы захотите выполнять эти действия.

**Условия хранения**

Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его. Храните препарат при температуре не выше 25 °С.