Инструкция по применению
Фторурацил-Тева Ампулы 5% 5 мл 1 шт

Характеристики

Форма выпуска: Ампулы
Страна: Россия
Производитель: ТЕВА
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Фторурацил
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 50 мг/мл



Описание

Раствор для внутрисосудистого и внутриполостного введения прозрачный, от бесцветного до слабо-желтого цвета, не содержащий видимых частиц.

Действующее вещество

Фторурацил

Состав

Фторурацил, натрия гидроксид, кислота хлористоводородная разбавленная (1:20), вода д/и.

Форма выпуска

Ампулы

Показания

рак толстой и прямой кишки, рак молочной железы, рак пищевода, рак желудка, рак поджелудочной железы, первичный рак печени, рак яичников, рак шейки матки, рак мочевого пузыря, злокачественные опухоли головы и шеи, рак предстательной железы, рак надпочечников, рак вульвы, рак полового члена, карциноид.

Способ применения и дозы

Способ применения и режим дозирования конкретного препарата зависят от его формы выпуска и других факторов. Оптимальный режим дозирования определяет врач. Следует строго соблюдать соответствие используемой лекарственной формы конкретного препарата показаниям к применению и режиму дозирования.

Противопоказания

повышенная чувствительность к фторурацилу и/или любому другому компоненту препарата, беременность и период кормления грудью, выраженная лейкопения, нейтропения, тромбоцитопения, стоматит, изъявления слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), псевдомембранозный энтероколит.

Применение при беременности и кормлении грудью

Фторурацил противопоказан при беременности. В случае необходимости применения в период лактации следует прекратить грудное вскармливание. Женщины детородного возраста должны применять надежные методы контрацепции во время терапии фторурацилом. В экспериментальных исследованиях установлено тератогенное и эмбриотоксическое действие фторурацила.

Побочные действия

Со стороны пищеварительной системы: диарея, стоматит, эзофагит, тошнота, рвота. Со стороны системы кроветворения: анемия, лейкопения, тромбоцитопения. Со стороны свертывающей системы крови: геморрагии. Со стороны ЦНС: атаксия, неврит зрительного нерва, головная боль, нистагм, нарушения зрения, светобоязнь, эйфория, спутанность сознания, дезориентация. Со стороны сердечно-сосудистой системы: ишемия миокарда, стенокардия, тромбофлебит. Со стороны репродуктивной системы: азооспермия, аменорея. Дерматологические реакции: алопеция, дерматит, гиперпигментация. Аллергические реакции: крапивница, бронхоспазм.

Взаимодействие с другими препаратами

При одновременном применении с другими препаратами, вызывающими миелодепрессию возможно аддитивное угнетение функции костного мозга, с интерфероном альфа-2b - возможно увеличение начальной концентрации фторурацила в плазме крови и уменьшение клиренса фторурацила. У пациентов с колоректальным раком при одновременном применении с метронидазолом возможно повышение токсичности фторурацила. В случае предшествующего применения фторурацила возможно ингибирование цитотоксического действия паклитаксела. В случае предшествующего применения циметидина возможно повышение концентрации фторурацила в плазме крови. При одновременном применении с аллопуринолом, метотрексатом возможное изменение противоопухолевого действия фторурацила, с кальция фолинатом – возможно усиление противоопухолевого и токсического действия фторурацила, особенно на ЖКТ.

Особые указания

Фторурацил является цитотоксическим препаратом, поэтому в обращении с ним необходимо соблюдать осторожность. При появлении стоматита или диареи лечение препаратом необходимо прекратить до исчезновения этих симптомов. Начальная доза должна быть уменьшена на 1/3 или 1/2 в следующих случаях: снижение массы тела, послеоперационный период не менее 30 дней после обширного хирургического вмешательства, недостаточная функция костного мозга, нарушение функции печени или почек.