Инструкция по применению
Фторурацил-Ронц флакон 50 мг/мл 20 мл 1 шт

Характеристики



Форма выпуска: Ампулы
Страна: Россия
Производитель: РОНЦ им.Н.Н. Блохина РАМН
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Фторурацил
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 50 мг/мл

Действующее вещество

Фторурацил

Состав

1 мл фторурацил 50 мг.

Форма выпуска

Ампулы

Показания

Рак кожи, рак толстой кишки, рак прямой кишки, рак молочной железы, рак желудка, рак печени, рак матки, рак яичников, рак мочевого пузыря.

Способ применения и дозы

Устанавливают индивидуально, в зависимости от показаний и стадии заболевания, состояния системы кроветворения, схемы противоопухолевой терапии.

Противопоказания

Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в фазе обострения, кровотечения любой локализации, высокая степень риска желудочно-кишечных кровотеченийвыраженная анемия, лейкопения, тромбоцитопениябеременность.

Применение при беременности и кормлении грудью

Фторурацил противопоказан при беременности. В случае необходимости применения в период лактации следует прекратить грудное вскармливание. Женщины детородного возраста должны применять надежные методы контрацепции во время терапии фторурацилом. В экспериментальных исследованиях установлено тератогенное и эмбриотоксическое действие фторурацила.

Побочные действия

Со стороны пищеварительной системы: диарея, стоматит, эзофагит, тошнота, рвота. Со стороны системы кроветворения: анемия, лейкопения, тромбоцитопения. Со стороны свертывающей системы крови: геморрагии. Со стороны ЦНС: атаксия, неврит зрительного нерва, головная боль, нистагм, нарушения зрения, светобоязнь, эйфория, спутанность сознания, дезориентация. Со стороны сердечно-сосудистой системы: ишемия миокарда, стенокардия, тромбофлебит. Со стороны репродуктивной системы: азооспермия, аменорея. Дерматологические реакции: алопеция, дерматит, гиперпигментация. Аллергические реакции: крапивница, бронхоспазм.

Особые указания

Со стороны пищеварительной системы: диарея, стоматит, эзофагит, тошнота, рвота. Со стороны системы кроветворения: анемия, лейкопения, тромбоцитопения. Со стороны свертывающей системы крови: геморрагии. Со стороны ЦНС: атаксия, неврит зрительного нерва, головная боль, нистагм, нарушения зрения, светобоязнь, эйфория, спутанность сознания, дезориентация. Со стороны сердечно-сосудистой системы: ишемия миокарда, стенокардия, тромбофлебит. Со стороны репродуктивной системы: азооспермия, аменорея. Дерматологические реакции: алопеция, дерматит, гиперпигментация. Аллергические реакции: крапивница, бронхоспазм.