Инструкция по применению
Фуцидин Г крем 15 г

Характеристики



Форма выпуска: Крем
Страна: Ирландия
Производитель: ЛЕО ФАРМА
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Гидрокортизон+Фузидовая кислота
Количество в упаковке: 1
Срок годности: 24

Действующее вещество

Гидрокортизон+Фузидовая кислота

Состав

Фузидовой кислоты гемигидрат 20.4 мг, что соответствует содержанию фузидовой кислоты безводной 20 мг.Вспомогательные вещества: цетиловый спирт - 111 мг, глицерол 85% - 111 мг, парафин жидкий - 111 мг, парафин белый мягкий - 56 мг, полисорбат 60 - 56 мг, хлористоводородная кислота - q.s. до pH 5, калия сорбат - 2.7 мг, бутилгидроксианизол - 40 мкг, вода - прибл. 531 мг

Форма выпуска

Крем

Показания

— кожные инфекции, вызванные бактериями, чувствительными к фузидовой кислоте.

Способ применения и дозы

Крем и мазь применяют наружно.У взрослых и детей с рождения до 18 лет крем или мазь наносят на пораженные участки кожи тонким слоем 3-4 раза/сут.При использовании марлевых повязок частота нанесения может быть уменьшена до 1-2 раз/сут.Продолжительность лечения зависит от формы и тяжести заболевания и в среднем составляет 7-14 дней.

Противопоказания

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Побочные действия

Побочные эффекты наблюдаются очень редко и могут ожидаться примерно у 5% пациентов.Определение частоты побочных реакций: очень часто (> 1/10), часто (> 1/100 и < 1/10), нечасто (> 1/1000 и < 1/100), редко (> 1/10 000 и < 1/1000), очень редко (<1/10 000).Дерматологические реакции: нечасто - сыпь (эритематозная, макулопапулезная, пустулезная), раздражение кожи, включая боль, чувство жжения, чувство покалывания на коже, зуд, сухость кожи, контактный дерматит; редко - экзема, периорбитальный отек, эритема.Аллергические реакции: редко - крапивница, ангионевротический отек, экзема.Со стороны органа зрения: редко - раздражение конъюнктивы.Пациент должен сообщить врачу о возникновении любых указанных или не указанных выше побочных эффектах.

Условия хранения

Беречь от детей