Инструкция по применению
Фуцидин Крем 2 % 15 г

Характеристики

Форма выпуска: Крем
Страна: Норвегия
Производитель: ЛЕО ФАРМА
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Фузидовая кислота
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 2%



Действующее вещество

Фузидовая кислота

Состав

Действующее вещество: фузидовой кислоты гемигидрат 20, 4 мг (в пересчете на кислоту безводную – 20, 0 мг).Вспомогательные вещества: цетиловый спирт – 111 мг; глицерол 85% – 111 мг; парафин жидкий – 111 мг; парафин мягкий белый – 56 мг; полисорбат 60 – 56 мг; хлористоводородная кислота q. s. до pH 5; калия сорбат – 2, 7 мг; бутилгидроксианизол – 0, 04 мг; вода прибл. 531 мг.Концентрация действующего вещества (%): 2%

Форма выпуска

Крем

Показания

Кожные инфекции, вызванные бактериями, чувствительными к фузидовой кислоте.

Способ применения и дозы

Способ применения и дозы Наружно. У взрослых и детей с рождения до 18 лет крем наносят на пораженные участки кожи тонким слоем 3-4 раза в день. При использовании марлевых повязок частота нанесения может быть уменьшена до 1-2 раз в день. Продолжительность лечения зависит от формы и тяжести заболевания и в среднем составляет 7-14 дней.

Противопоказания

Гиперчувствительность к компонентам препарата.С осторожностью: беременность, период лактации

Побочные действия

Частота побочных эффектов относится к категории очень редко – побочные эффекты могут ожидаться примерно у 5% пациентов. Ниже приводятся данные о неблагоприятных побочных реакциях в зависимости от частоты из возникновения Очень часто ≥ 1/10 Часто ≥ 1/100 и < 1/10 Нечасто ≥ 1/1000 и < 1/100 Редко ≥ 1 /10000 и < 1/1000 Очень редко <1/10000 Нарушения со стороны кожи и подкожных тканей: Нечасто: Сыпь (эритематозная, макулопапулезная, пустулезная), раздражение кожи, включая боль, чувство жжения, чувство покалывания на коже, зуд, сухость кожи, контактный дерматит, Редко: крапивница, ангионевротический отек, экзема, периорбитальный отек, эритема. Нарушения со стороны иммунной системы: Редко: Аллергические реакции. Нарушения со стороны органа зрения: Редко: Раздражение конъюктивы. Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Особые указания

Повышает чувствительность к действию этанола.Лекарственные средства, подщелачивающие мочу, снижают эффект, а подкисляющие - повышают. Аминогликозиды и тетрациклин усиливают противомикробные свойства.В ходе лечения должны соблюдаться меры предосторожности, как и при использовании ингибиторов моноаминооксидазы, а именно: исключение из диеты продуктов, содержащих тирамин: сыр, сливки, фасоль, маринованная сельдь, крепкий кофе.Для профилактики невритов при длительном применении необходимо сочетать с витаминами группы В.