Инструкция по применению
Фукорцин Раствор для наружного применения 25 мл

Характеристики

Форма выпуска: Раствор
Страна: Россия
Производитель: Самарамедпром
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Ацетон+Борная кислота+Рацементол
Количество в упаковке: 1



Описание

Жидкость темно-красного цвета с характерным запахом фенола.

Действующее вещество

Ацетон+Борная кислота+Рацементол

Состав

Действующие вещества: борная кислота 0,8 г, краситель фуксин основной 0,4 г, фенол 3,9 г, резорцинол 7,8 г,вспомогательные вещества: ацетон 4,9 г, этанол 95% 9,6 мл, вода очищенная до 100 мл.

Форма выпуска

Раствор

Показания

Гнойничковые и грибковые заболевания кожи поверхностные раны эрозии трещины ссадины кожи.

Способ применения и дозы

Наружно. Раствор наносят с помощью тампона или стеклянной палочки на пораженный участки кожи 2-4 раз в день. После высыхания жидкости на обработанный участок можно наносить мази и пасты.Особенности действия лекарственного препарата при первом приеме или при его отмене - нет сведений. Указание возможности и особенностей медицинского применения лекарственного препарата детьми взрослыми имеющими хронические заболевания - нет сведений.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью

Не рекомендуется применять женщинам в периоды беременности и в период грудного вскармливания.

Побочные действия

Местные реакции, возможно (особенно у детей) ощущение жжения и боли которое проходит самостоятельно и не требует отмены препарата.

Передозировка

При длительном использовании фукорцина и использовании его на обширных участках кожи возможна передозировка препарата что сопровождается явлениями характерными для отравления фенолом (головокружением слабостью нарушением дыхания). В случае возникновения таких явлений необходимо дать больному доступ свежего воздуха провести симптоматическое лечение.

Взаимодействие с другими препаратами

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами неизвестно.

Особые указания

Не следует наносить препарат на большие участки кожи так как фенол входящий в состав препарата может проникать в кровь и вызывать токсические явления (головокружение слабость).Препарат имеет своеобразный запах и красный цвет и может пачкать белье.Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:Нет сведений.

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.Хранить в недоступном для детей месте.