Инструкция по применению
Фукорцин раствор наружный 25 мл

Характеристики

Форма выпуска: Раствор
Страна: Россия
Производитель: Тульская ФФ
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Ацетон+Борная кислота+Рацементол
Количество в упаковке: 1



Действующее вещество

Ацетон+Борная кислота+Рацементол

Состав

Фуксин основной, Кислота борная, Фенол, Резорцин, Ацетон - 129,049 мг

Форма выпуска

Раствор

Показания

Гнойничковые и грибковые заболевания кожи, поверхностные раны, эрозии, трещины, ссадины кожи.

Способ применения и дозы

Раствор наносят с помощью тампона или стеклянной палочки на пораженные участки кожи 2-4 раза в день. После высыхания жидкости на обработанный участок можно наносить мази и пасты.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью

Не рекомендуется применять при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

Побочные действия

Местные реакции: возможно (особенно у детей) ощущение жжения и боли, которое проходит самостоятельно и не требует отмены препарата.

Взаимодействие с другими препаратами

После подсыхания раствора на обработанный участок можно наносить мази и пасты.

Особые указания

При длительном применении и нанесении на большую площадь поверхности тела возможно развитие симптомов токсического действия фенола (головокружение, слабость).