Инструкция по применению
Фулфлекс Мартиния Форте экстракт Капсулы 30 шт

Характеристики

Форма выпуска: Капсулы
Страна: Россия
Производитель: ВИС
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 30



Описание

Фулфлекс Мартиния Форте капсулы по 0,4 г №30Активные компоненты способствуют уменьшению воспаления в суставах, снятию отечности в суставах, уменьшению неприятных и болезненных ощущений в суставах, нормализации уровня мочевой кислоты.Фулфлекс МАРТИНИЯ ФОРТЕ ЭКСТРАКТ - в 8 раз больше гарпагозидов мартинии* , усиленных лютеолином.Нарушение пуринового обмена приводит к повышению концентрации мочевой кислоты в крови и моче, образованию уратных кристаллов и их отложению в мягких тканях, в том числе в области суставов верхних и нижних конечностей. Отложения кристаллов мочевой кислоты (ураты) формируют узелковые подкожные образования – тофусы. Тофусы могут инфицироваться, вызывать боль и приводить к снижению функции сустава.Состав ФУЛФЛЕКС МАРТИНИЯ ФОРТЕ ЭКСТРАКТ (в 2-х капсулах):Мартинии душистой экстракт (стандартизованный по гарпагозидам) - 500 мгАрахис экстракт (стандартизованный по лютеолину) - 20,4 мгБиологически активные вещества:50 мг гарпагозидов (250% от рекомендуемого уровня суточного потребления, не превышает верхний допустимый уровень потребления)20 мг лютеолина (200% от рекомендуемого уровня суточного потребления, не превышает верхний допустимый уровень потребления).При нарушении пуринового обмена наблюдается повышенная выработка мочевой кислоты, которая может быть причиной гиперурикурии и гиперурикемии. Бессимптомная гиперурикемия, подагра и уратная форма мочекаменной болезни - наиболее частые формы нарушения пуринового обмена. Клиническое проявление отложения кристаллического урата натрия - подагра - чаще всего наблюдается у взрослых, особенно у мужчин, в виде артрита. Для исключения поражения почек

кристаллами мочевой кислоты (в т.ч. и для профилактики уратной мочекаменной болезни) актуально активное выявление подагры на ранних стадиях для снижения гиперурикемии.Диета играет немаловажную роль в снижении уровня мочевой кислота. Потенциальные источники противоподагрических соединений - фитохимические вещества некоторых растений, которые продемонстрировали эффекты в снижении содержания уратов в сыворотке крови. Растения всё чаще используются в народной медицине для дополнительной поддержки при лечении подагры.Мартиния Душистая (Harpagophytum, Коготь Дьявола) - исследования показывают, что растение Мартиния богато активными веществами с антихолестериновым, антиоксидантным, противовоспалительным и обезболивающим действием для поддержки при дискомфорте в суставах, боли в пояснице, подагре. Выраженность противовоспалительного действия биологически активных веществ мартинии сопоставима с эффектом стандартных нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП).Гарпагозид способствует улучшению подвижности и гибкости суставов, уменьшению ощущения скованности в них, снижению выраженности болевого синдрома, уменьшению отёков и припухлости в воспаленных суставах.Арахис (Arachis hypogaea L) – источник лютеолина (флавоноид, встречающийся в некоторых растениях). Растения богатые лютеолином традиционно используются для лечения воспалительных заболеваний. По данным исследований лютеолин имеет самую высокую подавляющую активность среди флавоноидов в отношении фермента ксантиноксидазы, сопоставимую с лекарственными средствами. Обладает противовоспалительной активностью, снижая выработку провоспалительных молекул (интерлейкина-6 и фактора некроза опухолей-#), а также антиоксидантной активностью, связывая свободные радикалы. Лютеолин уменьшает выработку белка-переносчика URAT1, который возвращает в наш кровоток 90% мочевой кислоты, поступающей в почки. Снижение содержания мочевой кислоты в ткани печени может быть одним из механизмов защитного действия лютеолина. Также лютеолин способствует уменьшению отека тканей, вызванного отложением кристаллов уратов, и восстановлению функций почек, нарушенных избыточным уровнем мочевой кислоты.

Состав

Экстракт мартинии душистой, оболочка капсулы (желатин, краситель: титана диоксид), микрокристаллическая целлюлоза (носитель), экстракт арахиса.

Форма выпуска

Капсулы

Показания

В качестве биологически активной добавки к пище - источника гарпагозидов и лютеолина.

Способ применения и дозы

Взрослым по 1 капсуле 1-2 раза в день во время еды. Продолжительность приема - 4-6 недель. Возможны повторные приемы в течение года.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременность, кормление грудью. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом.

Особые указания

Биологически активная добавка (БАД) к пищеНе является лекарственным средством. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом-педиатром.

Условия хранения

Хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25# С.