Инструкция по применению
Фундизол Крем 30 мл

Характеристики

Форма выпуска: Крем
Страна: Россия
Производитель: Амма
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1
Срок годности: 12.0



Описание

Эффективное средство для лечения грибковых поражениях ногтей, грибковых и бактериальных поражениях кожи, «вросшем ногте». Фундизол размягчает и удаляет поврежденную часть ногтевой пластинки и поверхностный пораженный слой поврежденного грибком эпидермиса. Смягчает кожу стоп, заживляет кожные трещины. Устраняет неприятный запах ног. Безболезненно удаляет пораженную грибком часть ногтя. Фундизол не вызывает раздражение кожи. Не повреждает печень и желудок. «Подсушивает» кожные высыпания. Предотвращает излишнюю потливость стоп.Грибок ногтей – одно из самых распространенных заболеваний в дерматологии. На ряду с грибковым поражением кожи, грибок ногтей является инфекционным, а значит контагиозным (заразным) заболеванием. Заражение грибком, как правило, происходит в местах общественного пользования (баня, бассейн, тренажерный зал, душевые, пляж, косметические кабинеты, солярий), при использовании предметов одежды (носки, обувь). Наиболее эффективным методом борьбы с грибковой инфекцией ногтей является предупреждение возникновения этого заболевания.Для профилактики грибка ногтей необходимо соблюдение гигиенических мер – ношение индивидуальной обуви в общественных банях, бассейнах, нельзя использовать чужую обувь, носки.Грибок ногтей может не проявляться клинически в течение длительного времени. Изменение ногтевой пластинки и кожи вокруг ногтя происходят постепенно, по мере расщепления ферментами грибковых микроорганизмов компонентов, формирующих ноготь — кератин, коллаген, эластин и др. При грибковом поражении ногтей ногти могут изменить свой цвет, появляются неровности на ногтевой пластинке, за счет расслаивания колониями грибков происходит утолщение ногтя, ноготь отслаивается от подлежащей кожи. В результате этого появляется болезненность, дискомфорт при ношении обуви, формируется стереотип ношения закрытой обуви в жаркую погоду. Формируется своеобразный замкнутый круг, так как при повышенной влажности и температуре (именно такие условия складываются, когда нога потеет) создаются оптимальные условия для размножения грибков.Однако подобная ситуация как правило не бывает остро возникшей. Проявления грибковой инфекции стопы нарастают постепенно, и больной так же постепенно «свыкается» со своим заболеванием. При несоблюдении же им гигиенических норм, он автоматически становится разносчиком спор грибов.Для лечения и профилактики грибковых заболеваний ногтей специалистами фирмы Инфарма создано эффективное средство Фундизол.

Состав

Кислота салициловая, калий йодистый, цинка окись, метиловый и пропиловый эфиры параоксибензойной кислоты, экстракт трави чистотела, экстракт коры дуба.

Форма выпуска

Крем

Показания

Рекомендуется применять для лечения грибковых поражениях ногтей, кожи, гнойничковой сыпи, при лечении «вросшего ногтя». Крем устраняет явные высыпания и оказывает защитное действие, предотвращая заражение грибковой и бактериальной инфекцией (посещение общественных мест, бассейнов, пляжей, педикюрных кабинетов, спортзалов, бань, саун, соляриев, контакт с животными), снимает отечность, зуд и боль при инфицированных укусах насекомых, применяется в лечении угревой сыпи.

Способ применения и дозы

Лечение кремом Фундизол при грибковых поражениях ногтей: 2-3 раза в день крем «Фундизол» тонким слоем наносят на кожу стоп (рук), межпальцевые промежутки, здоровые ногтевые пластинки. При этом здоровые ногти становятся эластичными, розовеют и приобретают блеск. Кожа смягчается, прекращается шелушение, заживают трещины, уменьшается потливость и неприятный запах ног.Помимо этого 2 раза в день на поврежденные грибком ногти крем наносят толстым слоем (на ноготь и под ноготь), покрывают компрессной бумагой и фиксируют лейкопластырем на 4-6 часов (до 8 часов). Через 3-4 дня начинается размягчение и отслоение поврежденной части ногтевой пластинки (отслаивающую часть необходимо аккуратно состригать, спиливать пилкой не травмируя кожу). После полного удаления пораженной частя ногтя (4-8 недель) применение аппликации можно прекратить, продолжая ежедневную обработку ногтей и прилежащей кожи «Фундизолом» до полного отрастания ногтя (1-2 раза в день). Не отслоившуюся в течение месяца часть пораженного ногтя не следует насильно удалять. Это здоровый участок ногтя.Если после состригания пораженной части ногтевой пластинки кожа ногтевого ложа выглядит неровной (бугристая, покрытая волокнистыми образованиями), это говорит о поражении ее грибком. В этом случае лечение необходимо продлить. Продолжите двукратную обработку ногтевого ложа «Фундизолом» до его очищения (пораженная кожа ороговевает и отшелушивается). Выбросите старые носки, домашние тапочки и перчатки через 3-4 недели от начала применения «Фундизола»!!! Они в большей степени заражены спорами грибка.В последующем, для предотвращения заражения

грибковой инфекцией (с обуви, перчаток, белья и др.) рекомендуем профилактическую обработку ногтей «Фундизолом» 1-2 раза в деньГрибковое поражение кожи (стопы, кистей):Грибковые заболевания кожи (микозы) очень распространены в медицинской практике. Возбудителей кожной грибковой инфекции множество. Человек постоянно контактирует с различного рода грибами. Как правило защитная система организма способна справляться с сапрофитными организмами (бактерии и грибы не вызывающие в норме заболеваний у человека) на поверхности кожи. При снижении иммунных сил организма, что наблюдается при длительных хронических заболеваниях, вирусных инфекциях, иммунодефицитных состояниях, а также при нарушении баланса нормальной бактериальной флоры (например, при длительном приеме антибиотиков) возникают условия для внедрения и размножения грибковой флоры. Так же к развитию грибковых заболеваний кожи предрасполагают факторы среды, которую мы создаем. При повышенной потливости, ношении не сезонной обуви, возникают благоприятные для размножения грибков условия. Наиболее частым возбудителем грибковых заболеваний кожи являются грибы рода Candida.К заболеваниям кожи, вызванным грибковой инфекцией относятся: кератомикозы (разноцветный или отрубевидный лишай), кандидоз (поверхностный, в составе генерализованного), эпидермомикозы (эпидермофития паховая, эпидермофития стоп, руброфития, трихофития, микроспория, фавус).Лечение грибковых заболеваний кожи предполагает точное установление возбудителя и проводится под наблюдением специалистов.Лечение кремом Фундизол при грибковых поражениях кожи (грибок стопы, рук): 2-3 раза в день крем в достаточном количестве (пока не прекратиться всасывание) наносят на кожу, измененную в результате воздействия грибка. Эффект лечения проявляется через 3-4 дня. Однако для достижения стойкого результата лечения рекомендуется использовать крем не менее 2 недель. Не забудьте сменить обувь, носки, тапочки, перчатки, полотенца, нательное и постельное белье после устранения грибковой инфекции! Лечение кремом Фундизол при вросшем ногте:Во многих случаях врастание ногтевой пластинки в кожу обусловлено уплотнением и утолщением (гиперкератозом) ногтевой пластинки в связи с ее грибковым поражением. При лечении вросшего ногтя методика применения «Фундизола» совпадает с методикой применения при лечении грибковых поражений ногтей:Два раза в день обрабатывайте кремом кожу стоп и здоровые ногти. На измененные ногти крем накладывают толстым слоем, покрывают компрессной бумагой и фиксируют лейкопластырем на 4-6 часов 2 раза в день.Через 3-4 дня ноготь размягчается и появляется возможность его постепенного (от 2 недель до 2 месяцев) безболезненного состригания (спиливания). Состричь возможно только пораженную часть ногтя. Здоровый ноготь от ногтевого ложа не отслаивается. Замените носки, чулки, тапочки и до полного отрастания обрабатывайте растущие ногти «Фундизолом» 1 раз в день. Такая обработка делает растущий ноготь мягче и

эластичнее, что не дает ему возможности врастать и повреждать кожу.Для предупреждения заражения грибком при посещении пляжей, бассейнов, саун и др. обрабатывайте кремом стопы, межпальцевые промежутки и участки кожи, контактировавшие с поверхностями.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременность и кормление грудью.

Особые указания

Косметическое средство. Не является лекарством.

Условия хранения

Хранить в защищенном от солнечных лучей, сухом и недоступном для детей месте при температуре не выше +25°С.