Инструкция по применению
Фунгодерил средство от грибка ногтей и ног Раствор для наружного применения 1% 15 мл

Характеристики

Форма выпуска: Раствор
Страна: Россия
Производитель: Нижфарм
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Нафтифин
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 1%



Описание

Прозрачный раствор от бесцветного до светло-желтого цвета с запахом этанола

Действующее вещество

Нафтифин

Состав

Действующее вещество: нафтифина гидрохлорид 10,0 мг, вспомогательные вещества: пропиленгликоль, этанол 96%, вода очищенная.

Форма выпуска

Раствор

Фармакокинетика

При наружном применении нафтифин хорошо проникает в кожу, создавая устойчивые противогрибковые концентрации в различных её слоях, что делает возможность применения препарата один раз в день.

Показания

Грибковые инфекции кожи и кожных складок (tinea corporis, tinea inquinalis) межпальцевые микозы (tinea manum, tinea pedum) грибковые инфекции ногтей (онихомикозы) кандидозы кожи разноцветный (отрубевидный) лишай дерматомикозы (с сопутствующим зудом или без него)

Способ применения и дозы

Наружно. При поражении кожи Наносят 1 раз в день на пораженную поверхность кожи и прилегающие к ней участки (примерно 1 см здорового участка кожи по краям зоны поражения) после их тщательной очистки и высушивания. Продолжительность терапии при дерматомикозах — 2-4 недели (при необходимости до 8 недель), при кандидозах — 4 недели. При поражении ногтей Наносят на пораженный ноготь. Перед первым применением препарата максимально удаляют пораженную часть ногтя ножницами или пилкой для ногтей. Длительность терапии при онихомикозах — до 6 месяцев. Для предотвращения рецидива лечение следует продолжать в течение минимум 2 недель после исчезновения клинических симптомов.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к нафтифину или другим компонентам препарата, период беременность и период грудного вскармливания (безопасность и эффективность применения не установлены), нанесение на раневую поверхность.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение препарата противопоказано при беременности и в период грудного вскармливания (безопасность и эффективность нафтифина у данной категории пациентов не изучена)

Побочные действия

В отдельных случаях могут наблюдаться местные реакции: сухость кожи, гиперемия кожи (покраснение), жжение. Побочные эффекты носят обратимый характер и не требуют отмены лечения. Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, отмечаются любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, следует немедленно сообщить об этом врачу.

Передозировка

О случаях передозировки не сообщалось

Взаимодействие с другими препаратами

Нет сведений

Особые указания

Препарат не предназначен для применения в офтальмологии. Не следует допускать попадания препарата в глаза. Для достижения терапевтического эффекта требуется курсовое лечение. Препарат эффективен при лечении микозов, поражающих области кожи с гиперкератозом, а также в зонах роста волос. Влияние на способность к управлению транспортными средствами и работе с механизмами Не влияет

Срок хранения после открытия

2 года. Не использовать по истечении срока годности.

Условия хранения

При температуре не выше 30 °С. Хранить в недоступном для детей месте.