Инструкция по применению
Фунготербин Крем для наружного применения 1 % 15 г

Характеристики



Форма выпуска: Крем
Страна: Россия
Производитель: Нижфарм
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Тербинафин
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 1%

Описание

Крем белого или почти белого цвета со слабым характерным запахом

Действующее вещество

Тербинафин

Состав

100 г крема содержат: Активное вещество Тербинафина гидрохлорид (в пересчете на 100% сухое вещество) - 1,0 г, Вспомогательные вещества Бутилгидрокситолуол (дибунол) – 0,1 г, мочевина (карбамид) – 0,50 г, макрогола цетостеарат (Eumulgin® B 2) – 1,50 г, цетостеариловый спирт [цетиловый спирт не более 60 %, стеариловый спирт не менее 40 %] (Lanette® O) – 4,70 г, полоксамер (эмуксол-268, лутрол F 68) – 0,75 г, имидомочевина (Germall) – 0,20 г, пропиленгликоль – 23,00 г, парафин жидкий (масло вазелиновое медицинское) – 35,00 г, вазелин – 7,00 г, вода (вода очищенная) - до 100 г.

Форма выпуска

Крем

Фармакокинетика

При наружном применении препарат всасывается весьма незначительно (абсорбция - 5%), накапливается в коже, в сальных железах, волосяных фолликулах, подкожной клетчатке и оказывает свое действие преимущественно в месте нанесения.

Показания

Грибковые заболевания кожи, вызванные чувствительными возбудителями (трихофития, микроспория, эпидермофития, руброфития, кандидоз кожи): микоз стоп / «грибок стопы» (tinea pedis), микоз туловища (tinea corporis), включая микоз гладкой кожи и микоз крупных складок, эпидермофития паховая (tinea craris), поверхностный кандидоз кожи, вызванный грибами рода Candida (например, Candida albicans) , разноцветный лишай (pityriasis versicolor)

Способ применения и дозы

Наружно. Перед применением необходимо очистить и подсушить пораженные участки. Фунготербин® наносят 1 или 2 раза в сутки на пораженные участки кожи и прилежащие области. Крем накладывают тонким слоем и слегка втирают. При нанесении на область кожных складок (паховая область, межъягодичная, под молочными железами) рекомендуется прокладывать марлевую полоску / бинт. Дерматомикоз туловища, крупных складок, стоп, голеней: 1 раз в сутки, продолжительность лечения — 1 неделя. Дерматомикоз стоп: 1 раз в сутки, продолжительность лечения — 1 неделя. Кандидоз кожи: 1-2 раза в сутки, продолжительность лечения — 1 — 2 недели. Разноцветный лишай: 1-2 раза в сутки, продолжительность лечения — 1 неделя.

Противопоказания

Гиперчувствительность к тербинафину и/или другим компонентам препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью

Возможно только после тщательной оценки ожидаемой пользы для матери и риска для плода. При необходимости использования крема Фунготербин® в период лактации необходимо избегать контакта младенца с обработанной Фунготербином® областью. Не рекомендуется использование на обширных поверхностях.

Побочные действия

Местные реакции: зуд и жжение кожи, гиперемия (покраснение) в месте нанесения. Прекращения лечения не требуют. Аллергические реакции: генерализованная сыпь, крапивница, ангионевротический отек. Лечение следует прекратить и обратиться к врачу.

Передозировка

При наружном применении маловероятна. Симптомы: при случайном приеме крема внутрь возможны головная боль, тошнота, гастралгия, головокружение, учащенное мочеиспускание, сыпь. Лечение: активированный уголь, при необходимости — симптоматическая и поддерживающая терапия.

Взаимодействие с другими препаратами

Какие-либо взаимодействия крема Фунготербин® с другими лекарственными препаратами не известны.

Особые указания

Избегать попадания на слизистую оболочку глаз, носа, рта. При случайном попадании в глаза следует немедленно промыть их проточной водой. Восстановление здорового внешнего вида кожи отмечается в первые дни лечения, что не является признаком излечения. Следует помнить, что нерегулярное применение или преждевременное прекращение лечения повышает риск развития рецидива. В процессе лечения необходимо соблюдать общие правила гигиены для профилактики реинфицирования (повторного заражения) через белье и обувь. Отсутствие эффекта после 1 недели лечения требует уточнения диагноза. Фунготербин® не нарушает функции кожи и работы ее сальных и потовых желез. Фунготербин® обладает едва уловимым запахом и не оставляет следов на одежде.

Условия хранения

В сухом месте