Инструкция по применению
Фунготербин спрей для наружного применения 1% 30 мл

Характеристики



Форма выпуска: Спрей
Страна: Россия
Производитель: Нижфарм
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Тербинафин
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 1%
Срок годности: 24

Действующее вещество

Тербинафин

Состав

1 г спрея содержит активное вещество: тербинафина гидрохлорид — 10,0 мг, вспомогательные вещества: мочевина — 10,0 мг, бутилгидрокситолуол — 10,0 мг, этанол 95% — 150,0 мг, повидон низкомолекулярный — 10,0 мг, пропиленгликоль — до 1,0 г.

Форма выпуска

Спрей

Фармакокинетика

При наружном применении препарат всасывается весьма незначительно (абсорбция - 5%), накапливается в коже, в сальных железах, волосяных фолликулах, подкожной клетчатке и оказывает свое действие преимущественно в месте нанесения.

Показания

Грибковые заболевания кожи, вызванные такими дерматофитами, как Trichophyton (в том числе T. rubrum, T. mentagrophytes, T. verrucosum, T. violaceum), Microsporum canis и Epidermophyton floccosum: микоз стоп / грибок стопы (tinea pedis), микоз туловища (tinea corporis), включая микоз гладкой кожи и микоз крупных складок, эпидермофития паховая (tinea cruris). Поверхностный кандидоз кожи, вызванный грибами рода Candida (например, Candida albicans). Разноцветный лишай (Pityriasis versicolor), вызываемый Pityrosporum orbiculare.

Способ применения и дозы

Наружно. Препарат наносят на кожу один или два раза в сутки. Перед нанесением спрея необходимо очистить и подсушить пораженные участки. Препарат распыляют на пораженные участки в количестве, достаточном для их тщательного увлажнения, и, кроме того, наносят на прилегающие участки как пораженной, так и интактной кожи. Средняя продолжительность лечения: Дерматомикоз туловища, крупных складок, голеней, стоп: 1 неделя 1 раз в сутки. Кандидоз кожи: 1-2 недели 1 или 2 раза в сутки. Разноцветный лишай: 1 неделя 1 или 2 раза в сутки.

Противопоказания

Гиперчувствительность к тербинафину и/или другим компонентам препарата, детский возраст до 12 лет (отсутствие достаточного опыта применения).

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение при беременности возможно только в том случае, если потенциальная польза для матери превышает возможный риск для плода. При необходимости использования спрея Фунготербин® в период лактации необходимо избегать контакта младенца с обработанной Фунготербином® областью. Не рекомендуется использование на обширных поверхностях.

Побочные действия

В редких случаях в местах нанесения спрея возможно покраснение кожи, ощущение зуда или жжения, однако прекращение лечения по причине данных явлений требуется редко. Эти вышеназванные симптомы следует отличать от аллергических реакций, которые возникают редко, однако при их появлении необходимо прекратить лечение и обратиться к врачу — генерализованная сыпь, крапивница, ангионевротический отек.

Передозировка

О случаях передозировки препарата не сообщалось. Если же случайно препарат будет принят внутрь, можно ожидать развития таких же побочных явлений, как и при передозировке таблеток, содержащих тербинафин (головная боль, тошнота, боли в верхней части живота, головокружение). Следует также учитывать содержание в препарате этанола. Лечение: симптоматическая и поддерживающая терапия.

Взаимодействие с другими препаратами

Какие-либо лекарственные взаимодействия для препарата Фунготербин® спрей неизвестны.

Особые указания

В процессе лечения необходимо соблюдать общие правила гигиены для профилактики реинфицирования (через белье, обувь). Уменьшение выраженности клинических проявлений обычно отмечается в первые дни лечения. В случае нерегулярного лечения или преждевременного его прекращения существует риск возобновления инфекции. В случае, если через две недели лечения не отмечается признаков улучшения, следует провести верификацию диагноза. 1 флакон рассчитан на полный курс лечения. Спрей предназначен только для наружного использования. Следует избегать попадания препарата в глаза и на слизистые оболочки. При случайном попадании препарата в глаза, их следует немедленно промыть проточной водой, а в случае развития стойких явлений раздражения необходимо проконсультироваться с врачом.

Условия хранения

Беречь от детей