Инструкция по применению
Фурацилин Раствор спиртовой 10 мл

Характеристики



Форма выпуска: Раствор
Страна: Россия
Производитель: Тульская ФФ
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Нитрофурал
Количество в упаковке: 1

Описание

Прозрачная жидкость желтого цвета со спиртовым запахом.

Действующее вещество

Нитрофурал

Состав

Действующее вещество: Нитрофурал (фурацилин) - 0,067 г Вспомогательное вещество: Этанол (этиловый спирт) 70 % - до 100 мл.

Форма выпуска

Раствор

Фармакокинетика

При местном и наружном применении всасывание незначительное.

Показания

Гнойные раны, пролежни, мелкие повреждения кожи (в т. ч. ссадины, царапины, трещины, порезы), острый наружный и средний отит.

Способ применения и дозы

Наружно: орошают раны и накладывают влажные повязки. Местно: при отитах спиртовой раствор, нагретый до температуры тела, ежедневно закапывают по 1-2 капли 2-3 раза в день или вводят на турундах в слуховой проход. Продолжительность лечения 3-5 дней.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к нитрофуралу, производным нитрофурана и/или другим компонентам препарата, кровотечение, аллергодерматозы, нарушение целостности (перфорация) барабанной перепонки, беременность, период грудного вскармливания, детский возраст до 1 года.

Побочные действия

Аллергические реакции, дерматит.

Передозировка

При передозировке возможно усиление побочных эффектов. Лечение: симптоматическое.

Взаимодействие с другими препаратами

Нет данных.

Особые указания

Применение препарата не влияет на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций (управление автотранспортом, работа с движущимися механизмами).

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре от 15 до 25°С. Хранить в недоступном для детей месте.