Инструкция по применению
Фурацилин Дальхимфарм Таблетки 20 мг 10 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Дальхимфарм
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Нитрофурал
Количество в упаковке: 10
Дозировка действующего вещества: 20 мг



Действующее вещество

Нитрофурал

Состав

Действующее вещество: Нитрофурал (Nitrofuralum)Концентрация действующего вещества (мг): Фурацилин 0,02г,натрия хлорид 0,8 г

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Гнойные раны;пролежни;ожоги II–III ст.;для подготовки гранулирующей поверхности к пересадкам кожи;блефарит;конъюнктивит;фурункулы наружного слухового прохода; остеомиелит;эмпиема околоносовых пазух и плевры (промывание полостей);острый наружный и средний отит;стоматит;гингивит;мелкие повреждения кожи (в т.ч. ссадины, царапины, трещины, порезы).

Способ применения и дозы

Наружно, в виде водного 0,02% (1:5000) или спиртового 0,066% (1:1500) растворов - орошают раны и накладывают влажные повязки. Внутриполостно - промывают гайморову и плевральную полость, полость рта.Для приготовления водного раствора 1 часть нитрофурала растворяют в 5000 частей изотонического раствора натрия хлорида или дистиллированной воды. Раствор стерилизуют при 100 °С в течение 30 мин. Спиртовой раствор готовят на 70% этиловом спирте.

Противопоказания

Гиперчувствительность;хронические аллергодерматозы;кровотечение.

Побочные действия

Возможны дерматиты, требующие временного перерыва или полного прекращения применения препарата.