Инструкция по применению
Фурацилин Таблетки 20 мг 10 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Ирбитский ХФЗ
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Нитрофурал
Количество в упаковке: 10
Дозировка действующего вещества: 20 мг



Описание

Таблетки круглые, плоские, с фаской и риской на одной стороне, желтого или зеленовато-желтого цвета с неравномерной окраской поверхности.

Действующее вещество

Нитрофурал

Состав

Действующее вещество: фурацилин - 20,0 мг, вспомогательные вещества: натрия хлорид - 800,0 мг.

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

При наружном и местном применении всасывание незначительное. Проникает через гистогематические барьеры и равномерно распределяется в жидкостях и тканях. Основной путь метаболизма - восстановление нитрогруппы. Выводится почками и частично с желчью.

Показания

Наружно: гнойные раны, пролежни, ожоги II-III ст., мелкие повреждения кожи (в т.ч. ссадины, царапины, трещины, порезы). Местно: блефарит, конъюнктивит, остеомиелит, эмпиема околоносовых пазух, плевры, инфекции мочевыводящих путей - промывание полостей, острый тонзиллит, стоматит, гингивит. В случае необходимости, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом перед применением лекарственного препарата.

Способ применения и дозы

Местно, наружно. Взрослым, водный 0,02% раствор нитрофурала готовят непосредственно перед применением: одну таблетку (20 мг Фурацилина) растворяют в 100 мл дистиллированной воды комнатной температуры или в теплой кипяченой воде. Для более быстрого растворения рекомендуется кипящая или горячая вода. Затем раствор охлаждают до комнатной температуры. Наружно, в виде водного 0,02% раствора - орошают раны и накладывают влажные повязки. Местно: эмпиема придаточных пазух носа (в т.ч. при гайморите) - промывание полости, остеомиелит после операции - промывание полости с последующим наложением влажной повязки, эмпиема плевры - после удаления гноя проводят промывание плевральной полости и вводят 20-100 мл водного раствора. Для промывания мочеиспускательного канала и мочевого пузыря применяют водный раствор с экспозицией 20 минут. При блефарите, конъюнктивите - инстилляция 0,02% раствора в конъюнктивальный мешок. При остром тонзиллите, стоматите, гингивите - полоскание рта и горла теплым 0,02% раствором по 100 мл 2-3 раза в день. Продолжительность лечения - по показаниям в зависимости от характера и локализации пораженного участка. Применяйте препарат только согласно тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции. В случае необходимости, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом перед применением лекарственного препарата.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к нитрофуралу, производным нитрофурана и/или другим компонентам состава, кровотечение, аллергодерматозы, выраженные нарушения функции почек.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение при беременности и в период грудного вскармливания возможно, если предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка.

Побочные действия

Аллергические реакции, дерматит, зуд кожи. Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или отмечаются любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, следует немедленно сообщить об этом врачу.

Передозировка

О случаях передозировки не сообщалось.

Взаимодействие с другими препаратами

Не выявлены.

Особые указания

Не изучалось.Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:Препарат не влияет на способность управлять транспортом или заниматься другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С,в оригинальной упаковке (пачке).Беречь от попадания прямых солнечных лучей. Хранить в недоступном для детей месте.