Инструкция по применению
Фурацилин таблетки 20 мг 20 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Южфарм
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Нитрофурал
Количество в упаковке: 20
Дозировка действующего вещества: 20 мг



Описание

Круглые плоские таблетки для приготовления раствора для местного и наружного применения с фаской, желтого или зеленовато-желтого цвета с неравномерной окраской поверхности.

Действующее вещество

Нитрофурал

Состав

Состав на 1 таблетку: Действующее вещество: нитрофурал (фурацилин) - 20 мг, Вспомогательное вещество: натрия хлорид - 800 мг.

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

При наружном и местном применении всасывание незначительное. Проникает через гистогематические барьеры и равномерно распределяется в жидкостях и тканях. Основной путь метаболизма - восстановление нитрогруппы. Выводится почками и частично с желчью.

Показания

Наружно: гнойные раны, пролежни, ожоги I-III степени, мелкие повреждения кожи (в т. ч. ссадины, царапины, трещины, порезы). Местно: блефарит, конъюнктивит, остеомиелит, эмпиема придаточных пазух носа и плевры, инфекции мочевыводящих путей - промывание полостей, острый тонзиллит, стоматит, гингивит.

Способ применения и дозы

Наружно, местно. Водный 0,02% раствор нитрофурала готовят непосредственно перед применением: 1 таблетку (20 мг) растворяют в 100 мл дистиллированной или кипяченой воды. Для более быстрого растворения рекомендуется кипящая или горячая вода. Затем раствор охлаждают до комнатной температуры. Наружно: орошают раны, накладывают влажные повязки. Местно: эмпиема придаточных пазух носа (в т.ч. при гайморите) - промывание полости: остеомиелит после операции - промывание полости с последующим наложением влажной повязки, эмпиема плевры - после удаления гноя проводят промывание плевральной полости и вводят 20-100 мл водного раствора. Для промывания мочеиспускательного канала и мочевого пузыря применяют водный раствор с экспозицией 20 минут. Блефарит, конъюнктивит - инстилляция водного раствора в конъюнктивальный мешок. При тонзиллите, стоматите, гингивите - полоскание рта и горла по 100 мл 2-3 раза в день. Продолжительность лечения - по показаниям в зависимости от характера и локализации пораженного участка.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к нитрофуралу, производным нитрофурана и/или другим компонентам препарата, кровотечение, аллергодерматозы, выраженные нарушения функции почек.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение при беременности и в период грудного вскармливания возможно, если предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка.

Побочные действия

Аллергические реакции, дерматит, зуд кожи. Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

О случаях передозировки не сообщалось.

Условия хранения

В сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.