Инструкция по применению
Фурацилин Авексима Таблетки для приготовления раствора для местного и наружного применения 20 мг 10 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Авексима
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Нитрофурал
Количество в упаковке: 10
Дозировка действующего вещества: 20 мг



Описание

Таблетки желтого или зеленовато-желтого цвета, с неравномерной окраской поверхности, плоскоцилиндрические с риской и фаской.

Действующее вещество

Нитрофурал

Состав

1 таблетка содержит: действующее вещество: нитрофурал (фурацилин) - 20 мг, вспомогательные вещества: натрия хлорид.

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

При местном и наружном применении всасывание незначительное. Проникает через гистогематические барьеры и равномерно распределяется в жидкостях и тканях. Основной путь метаболизма - восстановление нитрогруппы. Выводится почками и частично с желчью.

Показания

Наружно: гнойные раны, пролежни, ожоги II-III степени, мелкие повреждения кожи (в том числе ссадины, царапины, трещины, порезы). Местно: блефарит, конъюнктивит, фурункул наружного слухового прохода, остеомиелит, эмпиема околоносовых пазух, плевры (промывание полостей), острый наружный и средний отит, ангина, стоматит, гингивит.

Способ применения и дозы

Местно, наружно. Наружно, в виде водного 0,02% (1:5000) или спиртового 0,066% (1: 1500) растворов - орошают раны и накладывают влажные повязки. Местно (водный раствор): эмпиема придаточных пазух носа (в т.ч. при гайморите) - промывание полости, остеомиелит после операции - промывание полости с последующим наложением влажной повязки, эмпиема плевры - после удаления гноя проводят промывание плевральной полости и вводят 20-100 мл водного раствора. Для промывания мочеиспускательного канала и мочевого пузыря применяют водный раствор с экспозицией 20 мин. При отитах - перед закапыванием раствора необходимо ввести в наружный слуховой проход марлевую турунду. Спиртовой раствор, нагретый до температуры тела, ежедневно закапывается по 5-6 капель в наружный слуховой проход. Кратность применения определяется индивидуально в зависимости от характера и выраженности воспалительного процесса. Блефарит, конъюнктивит - инстилляция водного раствора в конъюнктивальный мешок. Для полоскания рта и горла - 20 мг (1 таблетка) растворяют в 100 мл воды. Продолжительность курса терапии Зависит от показаний, характера и локализации пораженного участка., Инструкция по приготовлению растворов Водный 0,02% раствор нитрофурала готовят непосредственно перед применением: 1 таблетку (20 мг) растворяют в 100 мл 0,9% раствора натрия хлорида, дистиллированной или теплой кипяченой воды. Спиртовой раствор готовят путем растворения 1 части нитрофурала в 1500 частей 70% раствора этилового спирта (этанола).

Противопоказания

Гиперчувствительность к нитрофуралу, производным нитрофурана и/или к любому из вспомогательных веществ, кровотечения, аллергодерматозы, выраженные нарушения функции почек.

Применение при беременности и кормлении грудью

Допускается применение при беременности и лактации.

Побочные действия

Нарушения со стороны иммунной системы: аллергические реакции. Со стороны кожи и подкожных тканей: зуд кожи, дерматит.

Передозировка

При передозировке возможно усиление побочных эффектов. Лечение - симптоматическое.

Взаимодействие с другими препаратами

Несовместим с эпинефрином (адреналин), прокаином (новокаин), тетракаином, резорцинолом (резорцин) и другими восстановителями, так как разлагается с образованием окрашенных в розовый или буроватый цвет продуктов. Несовместим с калия перманганатом, перекисью водорода и другими окислителями вследствие окисления препарата.

Особые указания

Применение препарата у пациентов при тяжелых ожогах на больших поверхностях: при нарушении функции почек возможно прогрессирование почечной недостаточности (уремия, нарушение водно-электролитного баланса, метаболический ацидоз).Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:

Условия хранения

Хранить в сухом защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.