Инструкция по применению
Фурагин-ЛекТ Таблетки 50 мг 30 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Тюменский ХФЗ
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Фуразидин
Количество в упаковке: 30
Дозировка действующего вещества: 50 мг

Описание

Таблетки от желтого до желтого с оранжевым оттенком цвета, круглые, плоскоцилиндрической формы, с наличием фаски.

Действующее вещество

Фуразидин

Состав

На одну таблетку Действующее вещество: фуразидин - 50 мг, Вспомогательные вещества: крахмал картофельный - 20 мг, лактозы моногидрат (сахар молочный) - 18,8 мг, сахароза (сахар) - 10 мг, кальция стеарат- 1,0 мг, полисорбат-80 (твин-80) - 0,2 мг.

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

Абсорбируется в дистальном сегменте кишечника путем пассивной диффузии. Выводится почками (6 %), создавая в моче концентрации многократно превосходящие бактериостатические (максимальная концентрация Cmax в моче-5,7 мкг/мл).

Показания

Применяют внутрь. Внутрь назначают главным образом при инфекционных заболеваниях почек и мочевыводящих путей (острые и хронические пиелонефриты, циститы, уретриты, инфекции после оперативных вмешательств) и иногда при инфекционно-воспалительных заболеваниях дыхательных путей.

Способ применения и дозы

Внутрь, после еды, запивая большим количеством жидкости. Взрослым - по 100-200 мг (в пересчете на необходимое количество таблеток) 2-3 раза в сутки в течение 7-10 дней. При необходимости можно провести повторный курс лечения через 10-15 суток. Максимальная суточная доза 600 мг. Для профилактики инфекций при урологических операциях, цистоскопии, катетеризации применяют однократно 50 мг за 30 мин до операции или манипуляции.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к фуразидину, препаратам группы нитрофурана, другим вспомогательным веществам, тяжелая хроническая почечная недостаточность (скорость клубочковой фильтрации менее 30 мл/мин), беременность, период грудного вскармливания, полинейропатия (включая диабетическую), порфирия, дефицит лактозы, сахарозы/изомальтозы, непереносимость лактозы, фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция, - дефицит глюкозо-6-фосфат-дегидрогеназы,детский возраст до 18 лет (для данной лекарственной формы).

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение Фуразидина противопоказано между 38-й и 42-й неделями беременности и в период лактации.

Побочные действия

У определенной категории больных прием препарата, как и любых других лекарственных соединений, может приводить к развитию побочных реакций. Это может быть: анорексия, снижение аппетита, тошнота, рвота, головокружение, аллергические, реакции (кожная сыпь, энантемы, ангионевротический отек, припухание суставов, зуд): При выраженных побочных явлениях дальнейший прием препарата прекращают. Проинформируйте лечащего врача о появлении у Вас любых нежелательных или неприятных реакций и ощущений, не включенных в этот список.

Передозировка

Симптомы: нейротоксические реакции, в том числе атаксия, тремор. Лечение: отмена лекарственного средства, прием большого количества жидкости, симптоматическая терапия, антигистаминные лекарственные средства, витамины группы "В". Специфического антидота нет.

Взаимодействие с другими препаратами

Проинформируйте врача о любых принимаемых Вами лекарственных препаратах. При одновременном применении Фуразидина и налидиксовой кислоты отмечается уменьшение бактериостатического действия Фуразидина. При одновременном применении с урикозурическими препаратами (пробенецид, сульфинпиразон). уменьшается выведение фуразидина с мочой, что приводит к снижению его терапевтической эффективности. Это может привести к кумуляции фуразидина в организме и повышению токсичности препарата. При одновременном применении Фуразидина и антацидов, содержащих магния трисиликат, уменьшается абсорбция. Не употреблять спиртные напитки.

Особые указания

Для предупреждения развития побочных эффектов препарат запивают большим количеством жидкости, а при необходимости уменьшить дозу и провести десенсибилизирующую терапию. Побочные эффекты чаще развиваются у пациентов со снижением выделительной функции почек. Во время длительного лечения препаратом следует периодически контролировать уровень лейкоцитов в крови, а также показатели функции печени и почек.Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:Препарат не влияет на скорость психомоторных реакций, поэтому его можно назначать пациентам, деятельность которых требует повышенного внимания.

Условия хранения

Хранить в защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.