Инструкция по применению
Фурагин таблетки 10 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Оболенское ФП
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Фуразидин
Количество в упаковке: 10
Дозировка действующего вещества: 50 мг



Описание

Таблетки фурагин - антибактериальный препарат, производное нитрофурана. Уроантисептик. Противомикробное средство, производное нитрофурана. Активен в отношении грамположительных и грамотрицательных микробов, патогенных штаммов Staphylococcus spp. и других микроорганизмов, резистентных к антибиотикам. Эффективен в отношении грамположительных кокков (Staphylococcus spp., Streptococcus spp.), грамотрицательных палочек (Escherichia spp., Salmonella spp., Shigella spp., Proteus spp., Klebsiella spp., Enterobacter spp.), простейших (Lamblia intestinalis).

Действующее вещество

Фуразидин

Состав

Фуразидин.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Лечение инфекционно-воспалительных заболеваний мочевыводящих путей, лечение вторичных инфекционных осложнений после оперативных вмешательств на органах мочеполовой системы.

Способ применения и дозы

Фурагин применяют внутрь по 50-200 мг 2-3 раза/сут после еды в течение 7-10 дней, при необходимости можно провести повторный курс лечения через 10-15 сут.

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказано

Побочные действия

Со стороны пищеварительной системы: тошнота, рвота, снижение аппетита, нарушение функций печени.Со стороны ЦНС: головокружение, головная боль, развитие полиневритов.Аллергические реакции: крапивница, кожный зуд.

Особые указания

Противопоказания к применению— нарушение функции почек,— нарушение функции печени,— детский возраст 1 года,— беременность,— лактация,— повышенная чувствительность к производным нитрофурана.С осторожностью при дефиците глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы.