Инструкция по применению
Фуросемид Раствор для внутривенного и внутримышечного введения 20 мг/2 мл 2 мл 10 шт

Характеристики

Форма выпуска: Раствор для инъекций
Страна: Беларусь
Производитель: Борисовский Завод Медицинских Препаратов
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Фуросемид
Количество в упаковке: 10



Описание

Прозрачная бесцветная или слегка желтоватого цвета жидкость.

Действующее вещество

Фуросемид

Состав

Лекарственный препарат Фуросемид содержит: Действующее вещество: фуросемид. Одна ампула (2 мл) содержит фуросемида 20 мг. Вспомогательные вещества: натрия гидроксид, натрия хлорид, вода для инъекций.

Форма выпуска

Раствор для инъекций

Показания

Фуросемид применяется в следующих случаях: при необходимости быстрого и эффективного удаления лишней жидкости из организма при невозможности приема фуросемида внутрь в экстренных случаях если у вас слишком много жидкости в организме вследствие заболевания сердца, легких, печени или почек при гипертоническом кризе (очень высокое артериальное давление), который может привести к опасным для жизни состояниям.

Способ применения и дозы

Инструкция по применению Фуросемида Способ введения: Внутривенно (медленно, не быстрее 4 мг/мин) В исключительных случаях - внутримышечно Дозировка для взрослых: Начальная доза: 20-50 мг Максимальная суточная: до 1500 мг Для пожилых пациентов - более низкие дозы Дозировка для детей (до 15 лет): Только в исключительных случаях 0,5-1,5 мг/кг массы тела в сутки Максимум: 20 мг в сутки Важные правила применения: Нельзя смешивать с другими препаратами в одном шприце Рекомендуется как можно скорее перейти на пероральный прием При непрерывном введении предпочтительнее низкие дозы через короткие интервалы (около 4 часов) Особые указания: При пропуске введения - немедленно сообщить врачу При тяжелых аллергических реакциях (отек лица/горла, повышение температуры) - срочно обратиться к медперсоналу Нельзя прекращать лечение без согласования с врачом Показания к парентеральному введению: Невозможность приема внутрь Необходимость быстрого эффекта Нарушение всасывания в кишечнике При передозировке: Прекратить введение Уложить пациента с приподнятыми ногами Обеспечить доступ воздуха Провести коррекцию водно-электролитного баланса Противопоказания: Нельзя смешивать с другими препаратами Требуется контроль pH при разведении раствора Перед введением проверить прозрачность и отсутствие частиц в растворе

Противопоказания

Не применяйте препарат Фуросемид, если: у вас аллергия на фуросемид или любой другой компонент этого лекарственного препарата у вас аллергия на сульфаниламиды препараты сульфонилмочевины (например, глибенкламид, гликлазид) или антибиотики из группы сульфаниламидов), так как при этом может наблюдаться повышенная чувствительность к фуросемиду у вас сильное обезвоживание (вы потеряли много жидкости, например, из-за сильной диареи или болезни) у вас почечная недостаточность или не выделяется моча, несмотря на лечение фуросемидом у вас почечная недостаточность из-за отравления токсическими веществами, действующими на почки или печень у вас очень низкий уровень калия или натрия в крови пациент находится в коме, вызванной нарушением функции печени вы кормите грудью. Если Вы не уверены, применимо ли что-либо из этого к вам, проконсультируйтесь с врачом.

Применение при беременности и кормлении грудью

Если вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом. Фуросемид не следует применять во время беременности, за исключением очень веских медицинских показаний. Не кормите грудью, если вам делают инъекции Фуросемида. Это связано с тем, что небольшое количество препарата может попасть в материнское молоко и уменьшить лактацию. Поговорите со своим врачом, прежде чем принимать это лекарство, если вы кормите грудью или планируете кормить грудью.

Побочные действия

Побочные эффекты Фуросемида Нечастые реакции (до 1% случаев): Кожные проявления: сыпь, зуд, чувствительность к солнцу Снижение тромбоцитов Глухота (возможно необратимая) Редкие реакции (до 0,1% случаев): Нарушения ЖКТ: тошнота, рвота, диарея Проблемы со слухом, шум в ушах Анафилаксия (требует срочной помощи) Мышечные проблемы: судороги, слабость Местные реакции в месте инъекции Изменения в анализах крови Головокружение, спутанность сознания Очень редкие реакции (до 0,01% случаев): Тяжелые мышечные нарушения Анемия Снижение лейкоцитов Панкреатит Другие возможные побочные эффекты: Снижение давления с головокружением Электролитные нарушения (калий, натрий, кальций, магний) Обострение подагры Ухудшение мочеиспускания Проявления диабета Желтуха при проблемах с печенью Обезвоживание У недоношенных детей: камни в почках При появлении любых побочных эффектов необходимо немедленно сообщить врачу. Особенно важно обратить внимание на тяжелые аллергические реакции, проблемы с сердцем и почками. Важно: при возникновении серьезных побочных эффектов требуется срочная медицинская помощь.

Передозировка

Если вы получили более высокую дозу лекарственного препарата Фуросемид, чем следовало Если вы обеспокоены тем, что вам, возможно, ввели слишком большую дозу препарата Фуросемид, немедленно обратитесь к своему врачу или другому медицинскому персоналу. Признаки, которые могут возникнуть, если вы получили слишком большую дозу препарата Фуросемид, включают сухость во рту, повышенную жажду, нерегулярное сердцебиение, изменения настроения, спазмы или боль в мышцах, тошноту или рвоту, необычную усталость или слабость, слабый пульс или потерю аппетита.

Взаимодействие с другими препаратами

Сообщите вашему лечащему врачу, если вы принимаете, недавно принимали или собираетесь принимать какие-либо другие лекарственные препараты, в том числе безрецептурные. Это важно, поскольку некоторые препараты нельзя применять вместе с препаратом Фуросемид. Сообщите своему врачу, если вы принимаете следующие препараты: литий (применяется для лечения психических нарушений). Фуросемид может усиливать его действие и нежелательные реакции. Ваш врач назначит вам этот препарат только в случае крайней необходимости, затем он проверит уровень лития и может изменить дозу препарата препараты для лечения заболеваний сердца, такие как дигоксин ваш врач может изменить дозу препарата препараты для лечения высокого артериального давления, включая тиазидные диуретики (такие как бендрофлуметиазид или гидрохлортиазид), ингибиторы АПФ (такие как лизиноприл), блокаторы рецепторов ангиотензина II (такие как лозартан), поскольку применение фуросемида одновременно с этими препаратами может привести к слишком сильному снижению артериального давления. Ваш врач может изменить дозу фуросемида препараты, снижающие уровень холестерина или липидов, такие как колестирамин, колестипол и фибраты (например, клофибрат), поскольку они могут снизить эффект фуросемида препараты для лечения сахарного диабета, такие как метформин и инсулин, так как при одновременном применении с фуросемидом может повышаться уровень сахара противовоспалительные препараты, включая нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП, такие как аспирин или целекоксиб), поскольку они могут уменьшить эффект фуросемида салицилаты (обезболивающие препараты) в высоких дозах могут усилить побочные эффекты фуросемида противовоспалительные или противоаллергические препараты, такие как глюкокортикостероиды, препараты, используемые для лечения язвы желудка, такие как карбеноксолон, слабительные препараты, так как в сочетании с фуросемидом они будут влиять на уровень натрия и калия. Врач проверит у вас уровень натрия и калия инъекционные препараты, используемые во время операций, в том числе тубокурарин, производные курарина и сукцинилхолин хлоралгидрат (применяется при проблемах со сном). В отдельных случаях внутривенное введение фуросемида в течение 24 ч до введения хлоралгидрата может вызвать приливы, повышенное потоотделение, тревогу, тошноту, повышение артериального давления и учащенное сердцебиение. Поэтому одновременное применение фуросемида и хлоралгидрата не рекомендуется фенитоин или фенобарбитал (применяются для лечения эпилепсии), так как они могут снизить эффект фуросемида теофиллин (применяется для лечения бронхиальной астмы), так как фуросемид может усилить его действие антибиотики, такие как цефалоспорины, полимиксины, аминогликозиды или хинолоны, или другие препараты, которые могут повлиять на функцию почек, например, иммунодепрессанты, йодсодержащие контрастные вещества, фоскарнет или пентамидин. Одновременное применение фуросемида с этими препаратами может

ухудшить функцию почек пробенецид (применяется для защиты почек), так как он может снизить эффект фуросемида препараты платины (применяются для лечения некоторых видов рака), так как фуросемид может усилить нежелательные реакции этого препарата метотрексат (применяется для лечения некоторых видов рака и артритах), так как он может ослаблять действие фуросемида препараты для повышения артериального давления (вазопрессорные амины), так как фуросемид может ослаблять их действие аминоглютетимид (применяется для подавления выработки кортикостероидов), так как он может усиливать нежелательные реакции фуросемида карбамазепин (применяется для лечения эпилепсии или шизофрении), так как он может усиливать нежелательные реакции фуросемида сукральфат (применяется для лечения язвы желудка). Не принимайте фуросемид в течение 2 часов после приема сукральфата, так как эффект фуросемида будет снижен циклоспорин А (применяется после трансплантации органов), так как при одновременном приеме с фуросемидом повышается риск развития подагрического артрита левотироксин (применяется при заболеваниях щитовидной железы). Фуросемид в высоких дозах может изменять концентрацию гормонов щитовидной железы рентгеноконтрастные вещества, так как может повышаться частота нарушений функции почек препараты, влияющие на частоту сердечных сокращений, такие как амиодарон, соталол, дофетилид и ибутилид, так как фуросемид может усилить их действие рисперидон (применяется для лечения психических расстройств). Еда и напитки Предполагается, что прием пищи не влияет на препарат Фуросемид, когда он вводится внутривенно. Длительное умеренное или чрезмерное употребление алкоголя повышает артериальное давление и снижает эффективность антигипертензивных препаратов. После употребления алкоголя во время лечения препаратом Фуросемид может наблюдаться головокружение и обмороки.

Особые указания

Введение фуросемида следует проводить только под наблюдением врача. Ваш врач может регулярно направлять вас для сдачи анализа крови на определение уровня сахара или мочевой кислоты. Также может быть необходимым определение уровня калия и натрия, особенно если у вас рвота или диарея. Препарат Фуросемид содержит натрий Данный лекарственный препарат в одной ампуле 2 мл содержит менее 1 ммоль (23 мг) натрия, т.е. практически не содержит натрия. Перед применением этого лекарственного препарата полностью прочитайте этот листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для вас сведения. Сохраните этот листок-вкладыш. Возможно, вам потребуется прочитать его еще раз. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу. Лекарственный препарат назначен именно вам. Не передавайте его другим людям. Он может навредить им, далее если симптомы их заболевания совпадают с вашими. Если у вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции. Фуросемид оказывает незначительное влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами. Пациенты по-разному реагируют на фуросемид. В отдельных случаях при применении фуросемида способность управлять автомобилем или работать с механизмами может быть снижена, особенно в начале терапии, при смене препарата или в сочетании с алкоголем.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке для защиты от света при температуре не выше 25 ° С. После вскрытия лекарственный препарат хранить в плотно закрытой упаковке. Разведенный раствор рекомендуется использовать сразу после приготовления. Допускается хранение разведенного раствора в течение 15 часов после приготовления с использованием в качестве растворителя Натрия хлорида, раствора изотонического для инфузий 0,9% или Рингера, раствора для инфузий. Храните лекарственный препарат Фуросемид в недоступном для детей месте.