Инструкция по применению
Галавит Таблетки подъязычные 25 мг 20 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Сэлвим
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество:
Аминодигидрофталазиндион натрия
Количество в упаковке: 20
Дозировка действующего вещества: 25 мг



Описание

Таблетки белого цвета с желтоватым оттенком, двояковыпуклые, без риски, с запахом ментола.

Действующее вещество

Аминодигидрофталазиндион натрия

Состав

Действующее вещество – аминодигидрофталазиндион натрия (Галавит®) 0,025 г; вспомогательные вещества – сорбитол 0,315 г, крахмал 0,14 г, лактоза 0,1 г, кальция стеарат 0,005 г, тальк 0,015 г, рацементол (ментол) 0,0001 г.

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

Выводится из организма в основном через почки. При подъязычном применении период полувыведения составляет 30 минут. Основные фармакологические эффекты наблюдаются в течение 72 часов.

Показания

В качестве иммуномодулятора и противовоспалительного средства в комплексной терапии иммунодефицитных состояний у взрослых и подростков старше 12 лет:- инфекционные кишечные заболевания, сопровождающиеся интоксикацией и/или диареей;- язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки;- вирусные гепатиты;- хронические рецидивирующие заболевания, вызванные вирусом герпеса;- заболевания, вызванные вирусом папилломы человека;- инфекционно-воспалительные заболевания урогенитального тракта (уретрит хламидийной и трихомонадной этиологии, хламидийный простатит, острый и хронический сальпингоофорит, эндометрит);- гнойно-воспалительные заболевания органов малого таза;- послеоперационная реабилитация пациенток с миомой матки;- осложнения послеоперационного периода у пациенток репродуктивного возраста;- гнойные хирургические заболевания (ожоговые поражения, хронический остеомиелит, гангренозный аппендицит с оментитом, перитонит, гнойный плеврит);- послеоперационные гнойно-септические осложнения и их профилактика (в т.ч. у онкологических пациентов);- хронический рецидивирующий фурункулез, рожа;- астенические состояния, невротические и соматоформные расстройства, снижение физической работоспособности (в т.ч. у спортсменов);- психические, поведенческие и постабстинентные расстройства при алкогольной и наркотической зависимости;- воспалительные заболевания слизистой оболочки полости рта и горла, заболевания пародонта;- частые рецидивирующие заболевания дыхательных путей и ЛОР-органов бактериальной и вирусной этиологии (в т.ч. частые ОРВИ, бронхит, пневмония, хронический тонзиллит, хронический отит, хронический аденоидит) и их профилактика.

Способ применения и дозы

Подъязычно по 1-й таблетке до 4-х раз в сутки или по 2 таблетки 2 раза в сутки: **\-****При острых респираторных инфекциях, гриппе, бронхите, пневмонии, тонзиллите, отите, аденоидите для лечения:** по 1 таблетке 4 раза в день. Курс 5 дней. **При хроническом и частом рецидивирующем течении** продолжить по 1 таблетке 4 раза в день через день курсом до 15 дней. **Для профилактики:** по 1 таблетке 2 раза в день. Курс 5-10 дней. * **При воспалительных заболеваниях слизистой оболочки полости рта и горла, заболеваниях пародонта**: по 1 таблетке 4 раза в день в течение 5 дней. Затем по 1 таблетке 4 раза в день через 3 суток курсом до 3-х недель. * **При хронических рецидивирующих заболеваниях, вызванных вирусом герпеса:** по 1 таблетке 4 раза в день в течение 10 дней. Затем по 1 таблетке 4 раза в день через сутки в течение 10 дней. * **Для повышения физической работоспособности:** по 1 таблетке 4 раза через день в течение 10 дней, затем по 1 таблетке 4 раза в день через 3 суток курсом до 3-х недель. Лечение Галавитом можно начать на любой стадии заболевания. Применяйте препарат согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции. Если после указанных курсов лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом.

Противопоказания

Беременность;- период лактации;- индивидуальная непереносимость.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение препарата противопоказано при беременности и в период лактации.

Побочные действия

В редких случаях возможны аллергические реакции. Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

Случаи передозировки не отмечены

Взаимодействие с другими препаратами

При одновременном применении возможно снижение курсовых доз антибиотиков. Галавит позволяет повысить эффективность антибиотикотерапии и снизить ее побочные эффекты. Случаи несовместимости с другими лекарственными препаратами не отмечены

Особые указания

В состав препарата входит сорбитол, пациенты с редкими наследственными патологиями, связанными с непереносимостью фруктозы и сорбитола, не должны принимать препарат. Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами: Препарат не оказывает влияния на способность к управлению транспортными средствами и работу с механизмами.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25°С, в защищенном от света месте. Хранить в недоступном для детей месте.