Инструкция по применению
Гальманин порошок для наружного применения 2 г 10 шт

Характеристики

Форма выпуска: Порошок
Страна: Россия
Производитель: Тульская ФФ
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Салициловая кислота+Цинка оксид
Количество в упаковке: 10



Действующее вещество

Салициловая кислота+Цинка оксид

Состав

100 г салициловая кислота 2 г цинка оксид 10 г. Вспомогательные вещества: натрия гидроксид - 1.783 мг, натрия хлорид - 6.9 мг, вода д/и - 988.317 мг.

Форма выпуска

Порошок

Показания

Комбинированный препарат для наружного применения. Салициловая кислота оказывает противовоспалительное, антисептическое и кератолитическое действие. Цинка оксид оказывает подсушивающее действие.

Способ применения и дозы

— подострая экзема различного генеза . — гипергидроз (потливость) стоп.

Противопоказания

Наружно. В виде присыпки тонким слоем порошок наносится на пораженные участки кожи и чистую (вымытую с мылом и вытертую насухо) кожу 1 раз в день.

Применение при беременности и кормлении грудью

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами
Применение препарата не влияет на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций (управление автотранспортом, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора).

Побочные действия

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами не изучалось.

Особые указания

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами не изучалось.