Инструкция по применению
Гальманин порошок 2 г 10 шт

Характеристики



Форма выпуска: Порошок
Страна: Россия
Производитель: Ивановская Фармацевтическая Фабрика
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Салициловая кислота+Цинка оксид
Количество в упаковке: 10

Описание

Порошок белого или серовато-белого цвета, жирный на ощупь.

Действующее вещество

Салициловая кислота+Цинка оксид

Состав

Состав на 100 г: Действующие вещества: Салициловая кислота - 2 г Цинка оксид - 10 г Вспомогательные вещества: Тальк - 44 г Крахмал картофельный - 44 г.

Форма выпуска

Порошок

Показания

Подострая экзема различного генеза гипергидроз (потливость) стоп.

Способ применения и дозы

Наружно. В виде присыпки тонким слоем порошок наносится на пораженные участки кожи и чистую (вымытую с мылом и вытертую насухо) кожу 1 раз в день. Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются или появляются новые симптомы необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям тому способу применения и в тех дозах которые указаны в инструкции по применению.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата детский возраст до 12 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

При беременности и в период грудного вскармливания применяют только в случае если предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. Перед применением препарата Гальманин если Вы беременны или предполагаете что Вы могли бы быть беременной или планируете беременность необходимо проконсультироваться с врачом.

Побочные действия

Аллергические реакции местные реакции - зуд жжение. Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются или Вы заметили любые другие побочные эффекты не указанные в инструкции сообщите об этом врачу.

Передозировка

До настоящего времени о случаях передозировки не сообщалось.

Взаимодействие с другими препаратами

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами не изучалось.

Особые указания

Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.: Применение препарата не влияет на выполнение потенциально опасных видов деятельности требующих особого внимания и быстрых реакций (управление автотранспортом работа с движущимися механизмами работа диспетчера и оператора).

Срок хранения после открытия

5 лет. Не применять по истечении срока годности.

Условия хранения

В сухом защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С. Хранить в местах недоступных для детей.