Инструкция по применению
Галстена Капли гомеопатические 20 мл

Характеристики

Форма выпуска: Капли
Страна: Австрия
Производитель: Richard Bittner
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Гомеопатический состав
Количество в упаковке: 1



Описание

Галстена - комплексный гомеопатический препарат. Галстена оказывает гепатопротекторное действие, проявляющееся в уменьшении выраженности синдрома цитолиза и внутрипеченочного холестаза, нормализует моторную и эвакуаторную функцию желчевыводящих путей, устраняет симптомы диспепсии. Галстена оказывает желчегонное, спазмолитическое, противовоспалительное действие, предупреждает образование камней желчного пузыря.

Действующее вещество

Гомеопатический состав

Состав

В 100 мл препарата содержится:активные компоненты: Carduus marianum (Carduus) (кардуус марианум) D1 2 мл, Taraxacum officinale (Taraxacum) (тараксакум официнале) D6 10 мл, Chelidonium majus (Chelidonium) (хелидониум майус) D6 10 мл, Natrium sulfuricum (натриум сульфурикум) D12 10 мл, Phosphorus (фосфорус) D12 10 мл; вспомогательные компоненты: спирт этиловый (этанол) - 43 % по массе 58 мл.

Форма выпуска

Капли

Показания

Галстена рекомендуется в составе комплексной терапии при:– острых и хронических заболеваниях печени (острый и хронический гепатит, гепатоз).– заболеваниях желчного пузыря (хронический холецистит, желчнокаменная болезнь).– постхолецистэктомическом синдроме.– хроническом панкреатите.

Способ применения и дозы

При остром и хроническом гепатите, гепатозе, хроническом панкреатите детям в возрасте до 1 года назначают по 1 капле, детям 1-12 лет - 5 капель, взрослым и подросткам - 10 капель. Кратность приема - 3 раза/сут. Длительность лечения - не менее 3 мес. При необходимости курс лечения можно повторить через 1 мес.При хроническом холецистите, желчнокаменной болезни, постхолецистэктомическом синдроме детям в возрасте до 12 лет назначают 5 капель, взрослым и подросткам - 10 капель. Кратность приема - 3 раза/сут. Длительность лечения - 3 мес. При необходимости курс лечения можно повторить через 1 мес.В острых случаях препарат назначают каждые 0.5-1 ч, но не более 8 раз/сут. После улучшения состояния препарат назначают 3 раза/сут.Препарат принимают за 30 мин до или через 1 ч после приема пищи (детям до 1 года - до или через 1 ч после кормления). Капли принимают в чистом виде или разводят в 1 столовой ложке воды. Детям до 1 года капли разводят в 1 чайной ложке воды или материнского молока.

Противопоказания

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД УПОТРЕБЛЕНИЕМ НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ

Применение при беременности и кормлении грудью

Вопрос о применении препарата Галстена при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) решается индивидуально в зависимости от клинической ситуации.

Особые указания

Поскольку препарат Галстена в форме капель гомеопатических содержит растительные природные компоненты, при хранении может наблюдаться незначительное помутнение раствора или ослабление запаха и вкуса, что не приводит к снижению эффективности препарата.

Условия хранения

При комнатной температуре. Беречь от детей