Инструкция по применению
Галстена Капли 50 мл

Характеристики

Форма выпуска: Капли
Страна: Австрия
Производитель: Richard Bittner
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Гомеопатический состав
Количество в упаковке: 1



Описание

Гомеопатический препарат, применяемый при заболеваниях печени и желчного пузыря

Действующее вещество

Гомеопатический состав

Состав

Расторопша пятнистая (Carduus) D1 2 мл, одуванчик лекарственный (Taraxacum) D6 10 мл, чистотел большой (Chelidonium) D6 10 мл, натрия сульфат (Natrium sulfuricum) D12 10 мл, фосфор (Phosphorus) D12 10 мл, Вспомогательные вещества: этанол 43% по массе.

Форма выпуска

Капли

Фармакокинетика

Действие препарата Галстена является результатом совокупного действия его компонентов, поэтому проведение кинетических наблюдений не представляется возможным, все вместе компоненты не могут быть прослежены с помощью маркеров или биоисследований. По этой же причине невозможно обнаружить и метаболиты препарата.

Показания

В составе комплексной терапии при: острых и хронических заболеваниях печени (гепатит, гепатоз), заболеваниях желчного пузыря (хронический холецистит, постхолецистэктомический синдром), хроническом панкреатите.

Способ применения и дозы

При остром и хроническом гепатите, гепатозе, хроническом панкреатите детям в возрасте до 1 года назначают по 1/2 таблетки или 1 капле, детям 1-12 лет - 1/2 таблетки или 5 капель, взрослым и подросткам - 1 таблетки или 10 капель. Кратность приема - 3 Длительность лечения - не менее 3 мес. При необходимости курс лечения можно повторить через 1 мес. При хроническом холецистите, желчнокаменной болезни, постхолецистэктомическом синдроме детям в возрасте до 12 лет назначают 1 /2 таблетки или 5 капель, взрослым и подросткам - 1 таблетки или 10 капель. Кратность приема - 3 Длительность лечения - 3 мес. При необходимости курс лечения можно повторить через 1 мес. В начале заболевания, а также в случаях, требующих быстрого ослабления симптомов, возможно назначение препарата каждые 0.5-1 ч детям до 1 года - по 1 капле, детям 1-12 лет - по 5 капель, взрослым и детям старше 12 лет - по 8-10 капель, но не более 8 раз/ После улучшения состояния препарат назначают 3 Препарат принимают за 30 мин до или через 1 ч после приема пищи (детям до 1 года - до или через 1 ч после кормления). Капли принимают в чистом виде или разводят в 1 столовой ложке воды. Детям до 1 года капли разводят в 1 чайной ложке воды или материнского молока. 1/2 таблетки также следует растворить в 1 чайной ложке воды или материнского молока и давать по 1 капле. Перед проглатыванием рекомендуется задержать препарат во рту на 20-30 сек. Таблетку следует держать под языком до полного рассасывания.

Противопоказания

Алкогольная зависимость, — повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью

Необходимо проконсультироваться с врачом.

Побочные действия

Редко: повышенное слюноотделение. Пациент должен быть информирован о том, что при возникновении других побочных эффектов следует обратиться к врачу.

Взаимодействие с другими препаратами

Клинически значимое взаимодействие препарата Галстена с другими лекарственными средствами не установлено.

Особые указания

Поскольку препарат Галстена в форме капель гомеопатических содержит растительные природные компоненты, при хранении может наблюдаться незначительное помутнение раствора или ослабление запаха и вкуса, что не приводит к снижению эффективности препарата.

Условия хранения

Беречь от детей. При комнатной температуре.