Инструкция по применению
Гастрацид Таблетки жевательные 20 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки жевательные
Страна: Нидерланды
Производитель: Валеант
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Алгелдрат+Магния гидроксид
Количество в упаковке: 20
Дозировка действующего вещества: 400 мг+214 мг

Действующее вещество

Алгелдрат+Магния гидроксид

Состав

Таблетки для рассасывания 1 таб. алгелдрат (алюминия гидроксид) 400 мг магния гидроксид 400 мг. Вспомогательные вещества: натрия хлорид - 26.85 мг, мальтодекстрин (клептоза линекапс) - 750 мг, сахароза (сахар) - 840.42 мг, кремния диоксид коллоидный (аэросил) - 24.6 мг, титана диоксид - 25 мг, крахмал прежелатинизированный (тип PA5PH) - 129.5 мг, натрия бензоат - 9.25 мг, ароматизатор банановый - 12.4 мг, ароматизатор малиновый - 6.1 мг.

Форма выпуска

Таблетки жевательные

Показания

— язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в фазе обострения . — острый гастрит с повышенной и нормальной секреторной функцией в фазе обострения, острый дуоденит . — грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, рефлюкс-эзофагит . — дискомфорт, изжога и боли в эпигастрии при погрешности в диете, после приема лекарств, в том числе глюкокортикостероидов и нестероидных противовоспалительных препаратов, а также после употребления кофе, никотина, алкоголя.

Способ применения и дозы

Внутрь. Таблетки следует разжевывать и держать во рту до полного рассасывания. Взрослым и детям старше 15 лет по 1-2 таблетки 4 раза в сут. через 1 ч после еды и вечером перед сном или при возникновении дискомфорта, болей в эпигастрии, изжоги. При язвенной болезни желудка препарат необходимо принять за 30 мин до приема пищи. Максимальная суточная доза - 12 таблеток. Детям от 10 до 15 лет назначают половину рекомендованной дозы для взрослых. Для профилактики - по 1 таблетке за 15 мин до приема лекарств, раздражающих слизистую оболочку пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки. Продолжительность лечения не должна превышать 15-20 дней.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Дефицит сахаразы / изомальтазы, непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция. Гипофосфатемия, выраженное нарушение функции почек, детский возраст до 10 лет, болезнь Альцгеймера, беременность. С осторожностью: в период лактации.

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказан во время беременности. Применять с осторожностью в период лактации.

Побочные действия

Запор, тошнота, рвота, боли в желудке спастического характера, изменение вкусовых ощущений, гипермагниемия, гипофосфатемия, гипокальциемия, гиперкальциурия, остеомаляция, остеопороз, гипералюминиемия, энцефалопатия, нефрокальциноз, нарушение функции почек, аллергические реакции. У больных с сопутствующей почечной недостаточностью - жажда, снижение артериального давления, гипорефлексия.

Особые указания

Запор, тошнота, рвота, боли в желудке спастического характера, изменение вкусовых ощущений, гипермагниемия, гипофосфатемия, гипокальциемия, гиперкальциурия, остеомаляция, остеопороз, гипералюминиемия, энцефалопатия, нефрокальциноз, нарушение функции почек, аллергические реакции. У больных с сопутствующей почечной недостаточностью - жажда, снижение артериального давления, гипорефлексия.