Инструкция по применению
Гастрофарм Таблетки 2,5 мг 6 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Болгария
Производитель: Биовет
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Молочная кислота
Количество в упаковке: 6
Дозировка действующего вещества: 2.5 г
Срок годности: 24.0

Действующее вещество

Молочная кислота

Состав

На 1 таблетку:Активное вещество:Субстанция - 1,575 г, состоящая из высушенных жизнеспособных клеток Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus штамм 51 (LB-51) - не менее 1 * 102 (число живых лактобактерий), белок - от 25,0% до 35,0% (в пересчете на общий азот - от 4,0 до 5,6%), молочная кислота - от 6,3% до 12,6%.
Вспомогательные компоненты:Сахароза - не более 0,9 г, стеарат магния - 0,025 г.

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

Данные о фармакокинетике препарата Гастрофарм не предоставлены.

Показания

— острый и хронический гастрит, сопровождающийся повышенной кислотностью желудочного сока;— язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки;— в качестве профилактического средства во время и после лечения препаратами, обладающими раздражающим действием на ЖКТ;— в качестве профилактического средства после погрешностей в диете (прием пищи, вызывающей повышение кислотности желудочного сока) и чрезмерного употребления алкоголя и курения.

Способ применения и дозы

Таблетки принимают внутрь за 30 мин до еды, разжевывая с небольшим количеством воды или предварительно размельчают и смешивают с небольшим количеством кипяченой воды комнатной температуры.При острых и хронических гастритах и при повышенной кислотности желудочного сока взрослым препарат назначают по 1-2 таб. 3 раза/сут; детям в возрасте от 3 до 12 лет - по 1/2 таб., в возрасте от 12 до 18 лет - по 1 таб. 3 раза/сут. Курс лечения - 30 дней.При острых гастритах и недостаточной эффективности терапии суточную дозу можно увеличить в 2 раза.Эффект наблюдается обычно к концу первой недели лечения.При язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки взрослым назначают по 3-4 таб. 3 раза/сут в течение 30 дней.Для профилактики препарат применяют в дозе1-2 таб. 3 раза/сут в течение 15 дней, при злоупотреблении алкоголем или курением - по 1-2 таб. 2-3 раза/сут.

Противопоказания

При применении по показаниям и в рекомендуемых дозах не установлены.

Применение при беременности и кормлении грудью

Данных о применении препарата при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) не предоставлено.

Побочные действия

При применении препарата по показаниям в рекомендованных дозах побочное действие не выявлено.

Передозировка

В настоящее время случаев передозировки препарата Гастрофарм не описано.

Взаимодействие с другими препаратами

Лекарственное взаимодействие препарата Гастрофарм не установлено и препарат может применяться с другими лекарственными средствами.

Особые указания

Препарат безвреден, не токсичен.При назначении препарата больным сахарным диабетом следует учитывать, что в 1 таб. содержится 0.9 г сахарозы.Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмамиПрепарат не влияет на способность к вождению автотранспорта.

Условия хранения

В сухом месте