Инструкция по применению
Гастрофарм Таблетки 18 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Болгария
Производитель: Биовет
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 18
Дозировка действующего вещества: 2.5 г
Срок годности: 48.0



Состав

Действующее вещество: Субстанции Гастрофарм (высушенных жизнеспособных клеток Lactobacillus Bulgaricus штамм -51 (LB 51) и биологически активных продуктов их жизнедеятельности)Концентрация действующего вещества (мг): 1575

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

Данные о фармакокинетике препарата Гастрофарм не предоставлены.

Показания

Лечение следующих состояний и заболеваний:острый и хронический гастрит; повышенная кислотность желудочного сока;язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки у детей с 3-летнего возраста и взрослых.Как профилактическое средство:во время и после лечения препаратами, раздражающими ЖКТ;при применении пищи, вызывающей повышение кислотности желудочного сока; после злоупотребления алкоголем и табаком.

Способ применения и дозы

Внутрь, за 30 минут до еды, разжевывая с небольшим количеством воды или предварительно размельчая и смешивая с небольшим количеством кипяченой воды комнатной температуры.В качестве лечебного средства: при лечении острого и хронического гастритов и повышенной кислотности желудочного сока взрослым - по 1–2 таблетке, детям с 3 до 12 лет - по 1/2 таблетки, с 12 до 18 лет - по 1 таблетке 3 раза в сутки в течение 30 дней.При остром гастрите и недостаточном эффекте суточную дозу можно увеличить в 2 раза.Эффект лечения обычно наступает к концу первой недели.При лечении язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки взрослым - по 3–4 таблетки 3 раза в сутки в течение 30 дней.В качестве профилактического средства: по 1–2 таблетке 3 раза в сутки в течение 15 дней, в случаях злоупотребления алкоголем или табаком - по 1–2 таблетке 2–3 раза в сутки.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата Гастрофарм.

Применение при беременности и кормлении грудью

Данных о применении препарата при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) не предоставлено.

Побочные действия

Не установлены. Препарат безвреден, нетоксичен и не оказывает отрицательного воздействия на водителей автотранспортных средств.

Передозировка

В настоящее время случаев передозировки препарата Гастрофарм не описано.

Взаимодействие с другими препаратами

Лекарственное взаимодействие препарата Гастрофарм не установлено и препарат может применяться с другими лекарственными средствами.

Особые указания

Препарат безвреден, не токсичен.При назначении препарата больным сахарным диабетом следует учитывать, что в 1 таб. содержится 0.9 г сахарозы.Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмамиПрепарат не влияет на способность к вождению автотранспорта.

Условия хранения

В сухом месте