# Инструкция по применению
# Геделикс Капли для приема внутрь 50 мл

## Характеристики




Форма выпуска: Капли
Страна: Германия
Производитель: КРЕВЕЛЬ МОЙЗЕЛЬБАХ
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Плюща листьев экстракт
Количество в упаковке: 1
Срок годности: 48

## Действующее вещество

Плюща листьев экстракт

## Состав

100 мл капель содержит:Активное вещество: экстракт листьев плюща (2.2-2.9:1) 4 г.

## Форма выпуска

Капли

## Показания

В качестве отхаркивающего средства при инфекционно-воспалительных заболеваниях верхних дыхательных путей и бронхов с трудно отделяемой мокротой.

## Способ применения и дозы

Если врач не назначил другой дозировки, Геделикс следует принимать внутрь 3 раза в день после еды: разовая доза суточная доза Взрослые и дети старше 10 лет 31 капля 93 каплиДети от 4-10 лет 21 капля 63 каплиДети от 2 -4 лет 16 капель 48 капельПрепарат следует принимать неразбавленным и запивать достаточным количеством воды (до 1 стакана воды). Длительность применения препарата зависит от тяжести заболевания, но должна составлять не менее 7 дней. После исчезновения симптомов заболевания рекомендуется продолжить лечение препаратом в течение 2-3 дней.

**Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, в том числе к мятному маслу. Бронхиальная астма. Предрасположенность к ларингоспазму. Недостаточность аргининсукцинат-синтетазы. Не следует применять для лечения грудных детей и детей до 2-х лет (в связи с возможностью возникновения ларингоспазма).

**Применение при беременности и кормлении грудью**

Не рекомендуется применять при беременности и в период лактации.

**Побочные действия**

Возможны аллергические реакции, тошнота, в редких случаях - боли в эпигастральной области.

**Передозировка**

Симптомы: возможны тошнота, рвота, диарея, гастроэнтерит.Лечение: отмена препарата, симптоматическая терапия.

**Взаимодействие с другими препаратами**

Препарат не следует применять одновременно с противокашлевыми ЛС, т.к. это затрудняет отхождение разжиженной мокроты.

**Особые указания**

Растение ядовито. При передозировке возникают тошнота, рвота, диарея, головная боль, может повышаться АД. При контакте с сырьем возможен дерматит.Не рекомендуется применять в детском возрасте.

**Условия хранения**

В сухом месте