Инструкция по применению
Геделикс Сироп 100 мл

Характеристики

Форма выпуска: Сироп
Страна: Германия
Производитель: КРЕВЕЛЬ МОЙЗЕЛЬБАХ
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Плюща листьев экстракт
Количество в упаковке: 1
Срок годности: 48



Действующее вещество

Плюща листьев экстракт

Состав

Действующим веществом является экстракт листьев плюща обыкновенного.В 100 мл сиропа содержится 0,8 грамма экстракта листьев плюща обыкновенного.Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются макрогола глицерилгидроксистеарат, аниса звездчатого плодов масло, гиэтеллоза, сорбитол жидкий 70 % (некристаллизующийся), пропиленгликоль, глицерол, вода очищенная

Форма выпуска

Сироп

Фармакокинетика

препараты, применяемые при кашле и простудных заболеваниях; отхаркивающие средства, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами; отхаркивающие средства

Показания

Препарат Геделикс® применяют у взрослых и детей в возрасте от 2 лет до 18 лет в качестве отхаркивающего средства при инфекционно-воспалительных заболеваниях верхних дыхательных путей и бронхов, сопровождающихся кашлем с трудно отделяемой мокротой.

Способ применения и дозы

Всегда принимайте данный препарат в полном соответствии с листком-вкладышем или с рекомендациями лечащего врача или работника аптеки. При появлении сомненийпосоветуйтесь с лечащим врачом, или работником аптеки.Рекомендуемая дозаВзрослым принимать по 5 мл (1 мерная ложка или 1 мерный шприц) 3 раза в день. Применение у детей и подростков:Детям в возрасте от 10 лет до 18 лет принимать по 5 мл (1 мерная ложка или 1 мерный шприц) 3 раза в день.Детям от 4 лет до 10 лет - по 2,5 мл (половина мерной ложки или мерного шприца) 4 раза в день. Детям от 2 лет до 4 лет - по 2,5 мл (половина мерной ложки или мерного шприца) 3 раза в день.Путь и (или) способ введенияПрепарат Геделикс® следует принимать внутрь после еды.Перед применением тщательно взболтайте флакон.Взрослым и детям старше 10 лет препарат Геделикс® рекомендуемся применять неразбавленным. Детям в возрасте от 2 лет до 10 лет препарат рекомендуется давать разбавленным в небольшом количестве воды. В период лечения препаратом рекомендуется употреблять достаточное количество жидкости в теплом виде (вода, чай и др.).В упаковке препарата на 100 мл находится мерная ложка, в упаковке на 200 мл находится мерный шприц.1 мерная ложка или 1 мерный шприц соответствует 5 мл. Использование мерного шприца:Плотно вставьте мерный шприц в горлышко флакона. Переверните флакон вверх дном и плавно потяните поршень вниз, набирая сироп в шприц до нужной отметки. Верните флакон в исходное положение и выньте шприц, аккуратно поворачивая его. Содержимое шприца может быть помещено непосредственно в ротовую полость или перемещено в ложку. После употребления промойте шприц и просушите его.Продолжительность терапииДлительность применения препарата зависит от тяжести заболевания, но должна составлять не менее 7 дней. После исчезновения симптомов заболевания рекомендуется продолжить лечение препаратом в течение 2-3 дней.Если в течение 7 дней улучшение не наступает, или появляются новые симптомы, обратитесь к врачу.Если Вы забыли принять препарат Геделикс®Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную дозу.При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

Противопоказания

Не принимайте препарат Геделикс®:• если у Вас аллергия на действующее вещество или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша);• если у Вас недостаточность фермента аргининсукцинат-синтетазы. Обратитесь к лечащему врачу перед приемом данного лекарственного препарата;• не давайте препарат детям в возрасте до 2 лет (из-за риска ухудшения респираторных симптомов заболевания вследствие приема препарата).

Применение при беременности и кормлении грудью

Не рекомендуется применять при беременности и в период лактации.

Побочные действия

Подобно всем лекарственным препаратам, препарат Геделикс® может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.Следующие возможные нежелательные реакции могут возникнуть:• аллергические реакции;• тошнота, рвота, диарея, в редких случаях - боли в области желудка.Сообщение о нежелательных реакцияхЕсли у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом, или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях в информационную базу данных по нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные препараты, включая сообщения о неэффективности лекарственных препаратов, выявленным на территории государства -члена ЕАЭС. Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Передозировка

Если Вы приняли препарата Геделикс® больше, чем следовалоПрием дозы, значительно превышающей рекомендованные суточные дозы может вызвать тошноту, рвоту, диарею, воспаление в желудке и кишечнике (гастроэнтерит).В случае передозировки следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу.Если Вы чувствуете развитие какой-либо нежелательной реакции, обратитесь к врачу.

Взаимодействие с другими препаратами

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты.Препарат Геделикс® не следует применять одновременно с лекарственными средствами, подавляющими кашель. Это затрудняет отхождение разжиженной мокроты.

Особые указания

Перед приемом препарата Геделикс® проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.• Если в течение 4-5 дней на фоне лечения препаратом Геделикс® улучшение не наступает, необходимо обратиться к врачу.• Если Ваше состояние ухудшается (например, появляются приступы удушья, гнойная мокрота или мокрота с прожилками крови при откашливании, повышается температура), необходимо обратиться к врачу.• Если у Вас сахарный диабет, учитывайте, что 5 миллилитров препарата содержат 1,75 г сорбитола (соответствует 0,44 г фруктозы), что соответствует 0,15 хлебных единиц.• С осторожностью применяйте препарат Геделикс®, если у Вас гастрит или язвенная болезнь желудка.ДетиПрепарат противопоказан к применению у детей в возрасте от 0 до 2 лет (см. Раздел 2., подраздел «Противопоказания»).Препарат Геделикс® содержит сорбитол и пропиленгликольЕсли у Вас непереносимость некоторых сахаров, обратитесь к лечащему врачу перед приемом данного лекарственного препарата.Пропиленгликоль может вызывать симптомы, схожие с приемом алкоголя.

Условия хранения

от 2# до 25#