Инструкция по применению
Геделикс Сироп 200 мл

Характеристики

Форма выпуска: Сироп
Страна: Германия
Производитель: КРЕВЕЛЬ МОЙЗЕЛЬБАХ
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Плюща листьев экстракт
Количество в упаковке: 1



Описание

Густоватая жидкость от желтого до желто-коричневого цвета своеобразного запаха,. В процессе хранения возможно помутнение и выпадение осадка.

Действующее вещество

Плюща листьев экстракт

Состав

На 100 мл препарата:Активные вещества:Плюща листьев экстракт (2,2-2,9:1) - 0,8000 гВспомогательные вещества:Макрогола глицерилгидроксистеарат - 0,5000 г, Аниса звездчатого плодов масло - 0,0150 г, Гиэтеллоза - 0,1500 г, Сорбитола раствор 70% (некристаллизующийся) - 50,0000 г, Пропиленгликоль -13,8770 г, Глицерол - 10,0000 г, Вода очищенная - 39,9605 г.

Форма выпуска

Сироп

Показания

В качестве отхаркивающего средства при инфекционно-воспалительных заболеваниях верхних дыхательных путей и бронхов, сопровождающихся кашлем с трудно отделяемой мокротой.

Способ применения и дозы

Геделикс следует принимать внутрь (после еды).Если врач не назначил иначе, рекомендуется придерживаться следующего режима дозирования:Взрослые и дети старше 10 лет - 3 раза в день:Разовая доза - 5 мл.Суточная доза - 15 мл.Дети от 4 до 10 лет - 4 раза в день:Разовая доза - 2.5 мл.Суточная доза - 10 мл.Дети от 1 до 4 лет - 3 раза в день:Разовая доза - 2.5 мл.Суточная доза - 7.5 мл.Дети от 0 до 1 года - 1 раз в день:Разовая доза - 2.5 мл.Суточная доза - 2.5 мл.В упаковке препарата 100 мл находится мерная ложечка, в упаковке 200 мл - мерный шприц. 1 мерная ложечка или 1 мерный шприц соответствует 5 мл.Перед употреблением следует тщательно взболтать флакон.Взрослым и подросткам Геделикс рекомендуется принимать неразбавленным.Грудным и маленьким детям Геделикс рекомендуется давать разбавленным в небольшом количестве воды.Длительность применения препарата зависит от тяжести заболевания, но должна составлять не менее 7 дней. После исчезновения симптомов заболевания рекомендуется продолжить лечение препаратом в течение 2-3 дней.Использование мерного шприцаПлотно вставить мерный шприц в горлышко флакона. Перевернуть флакон вверх дном и плавно потянуть поршень вниз, набирая сироп в шприц до нужной отметки. Вернуть флакон в исходное положение и вынуть шприц, аккуратно поворачивая его. Содержимое шприца может быть помещено непосредственно в ротовую полость или перемещено в ложку.После употребления промыть шприц и высушить его.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.Геделикс® сироп нельзя принимать при наследственной непереносимости фруктозы, недостаточности аргининсукцинат-синтетазы.

Применение при беременности и кормлении грудью

Препарат Геделикс® сироп не рекомендуется применять при беременности и в период грудного вскармливания.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции, тошнота, рвота, диарея, в редких случаях - боли в эпигастральной области.Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

Симптомы: возможны тошнота, рвота, диарея, гастроэнтерит.Лечение: отмена препарата, симптоматическая терапия.

Взаимодействие с другими препаратами

Препарат не следует применять одновременно с противокашлевыми лекарственными средствами, так как это затрудняет отхождение разжиженной мокроты.

Особые указания

В случае отсутствия лечебного эффекта на фоне приема препарата в течение 4-5 дней или ухудшения состояния пациента (появление приступов удушья, гнойной мокроты, повышение температуры), следует немедленно обратиться к врачу.Указания для пациентов с сахарным диабетом:Поскольку препарат Геделикс® не содержит сахара, его могут применять пациенты с сахарным диабетом. 5 мл препарата содержат 1,75 г сорбитола (соответствует 0,44 гфруктозы), что соответствует 0,15 ХЕ.Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:Применение препарата не влияет на способность управлению транспортными средствами и занятию другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Срок хранения после открытия

6 месяцев

Условия хранения

При температуре не выше 25°С в оригинальной упаковке (флакон в пачке).Хранить в недоступном для детей месте.